



	Stations météo au 11 juin 2023	Σ T°C depuis 1er février	Σ pluvio depuis 1er janvier
38	Bourgoin-Jallieu (358 m)	1435 (+227)	233 (+27)
	St-Étienne-St-Geoirs (384 m)	1300 (+212)	239 (+17)
	St-Laurent-du-Pont (410 m)	1279 (+206)	570 (+33)
	Chatte (272 m)	1397 (+218)	216 (+29)
	Roissard (746 m)	1274 (+200)	374 (+47)
	Villard-de-Lans (1027 m)	968 (+178)	472 (+88)
26	Chapelle-en-Vercors (879 m)	1118 (+191)	410 (+61)
	St-Christophe Laris (400 m)	1371 (+226)	246 (+7)
	Étoile-sur-Rhône (145 m)	1552 (+230)	156 (+25)
	St-Sauveur-en-Diois (338 m)	1413 (+217)	212 (+42)
07	Annonay (336 m)	1408 (+209)	254 (+61)
	Colombier-le-Jeune (566 m)	1357 (+222)	235 (+40)
	St-Agrève (1014 m)	1021 (+192)	310 (+27)
	Issanlas-Peyrebeille (1264 m)	860 (+182)	270 (+73)
	Aubenas-Lanas (265 m)	1524 (+222)	206 (+61)

Entre parenthèses : évolution sur les 15 derniers jours

Passer entre les gouttes

12 juin
2023

Beaucoup de récoltes d'herbe ont été faites la semaine dernière avant les orages du week-end. Le risque orageux sera encore important jusqu'à mercredi. **Un nouveau créneau de fauche semble se dessiner à partir de jeudi (soleil et vent du Nord).**

Les premiers foins vont pouvoir commencer à se faire en Montagne tandis que les deuxièmes coupes ont déjà débuté en Plaine.



« S'il tonne au mois de juin, année de paille et de foin »

Stade de l'herbe
Prairies naturelles et temporaires

Σ T°C

- 1400°C : début grenaison -> foin tardif
- 1200°C : pleine floraison -> foin classique
- 1000°C : pleine épiaison -> foin précoce
- 800°C : début épiaison -> ensilage/enrubannage/foin séché

Récoltes d'herbe

Plaine : Les deuxièmes coupes de luzerne et de prairie temporaire ont déjà commencé pour les parcelles fauchées une première fois fin-avril.




Préférer faucher la deuxième coupe des luzernes et des temporaires que de finir les foins de prés. Il vaut mieux assurer la valeur alimentaire des fourrages qui alimenteront les vaches traites cet hiver.

Montagne : Beaucoup de récoltes en enrubanné ont été faites la semaine dernière. Les premiers foins peuvent s'envisager pour les parcelles les plus avancées en stade.



Les volumes d'herbe sont importants et les sols sont humides. Surveiller la météo pour s'assurer d'au moins 4 jours favorables avant de se lancer dans les foins.

Figure 2. Influence de la hauteur de coupe sur la teneur en cendres totales du fourrage (Boonen J., 2010)



Une hauteur de fauche de plus de 7 cm est fortement bénéfique pour accélérer le séchage du fourrage, ainsi que pour limiter la proportion de terre dans les fourrages (et donc le risque butyrique).

Dérobées après moisson des céréales

Le début de la moisson des céréales d'hiver ne devrait bientôt plus tarder. **Il est temps de penser au semis des dérobées estivales !**

Objectif quantité : Sorgho fourrager multi-coupe type Sudan Grass (variété PIPER) à 25 kg/ha. Récolte à prévoir en ensilage/enrubannage. Faucher avant épiaison (2 coupes possibles).

Objectif qualité : Moha 15 kg/ha + trèfle d'Alexandrie 10 kg/ha. Mélange mono-coupe sauf si 1ère fauche très précoce. Récolte possible en foin à début-épiaison du moha.

Gestion du pâturage

Plaine : L'arrivée des températures élevées (plus de 25°C) a fait ralentir la pousse de l'herbe. De plus, la chaleur réduit l'ingestion d'herbe par les vaches à la pâture en pleine journée. Il faut remonter la distribution à l'auge pour compléter la ration journalière. **N'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller pour caler la nouvelle ration !**

Le réseau de suivi de la pousse de l'herbe

GAEC DE SULLY (Varacieux - 38)

Altitude : 420 m

18 ha de pâturage (28 ares/VL)

Pâturage uniquement la journée

Augmentation de la ration distribuée.

5,5 Kg de MS ingérée à la pâture

Hauteur moyenne 9,3 cm

Croissance : 31 Kg de MS/ha/jour

BERTHOIN Jean Luc (Chapelle en Vercors - 26)

Altitude : 880 m

14 ha de pâture (38 ares/VL)

Mise à l'herbe au 5 avril

14 Kg de MS ingérée à la pâture

Hauteur moyenne 9,4 cm

Croissance : 21 Kg de MS/ha/jour

GAEC DE LA MURE (Biol - 38)

Altitude : 500 m

27,5 ha de pâturage (42 ares/VL)

Pâturage jour et nuit sans ensilage

13,5 Kg de MS ingérée à la pâture

Hauteur moyenne : 8,7 cm

Croissance : 51 Kg de MS/ha/jour

BESSEAS Paul (Quintenas - 07)

Altitude : 400 m

13,8 ha de pâture (34 ares/VL)

Mise à l'herbe le 16 mars

6 Kg de MS ingérée à la pâture

Hauteur moyenne : 10,2 cm

Croissance : 40 Kg de MS/ha/jour

Montagne : Le pâturage continue avec de belles croissances d'herbe. Dans certaines parcelles, en raison des conditions humides, le 1^{er} passage n'a pas pu être réalisé. Il faut envisager de réserver ces parcelles à la fauche si elles sont mécanisables.

Zoom : pratiquer le topping pour le pic d'herbe



Le stock d'herbe sur pied dans les pâtures est parfois conséquent et la valeur alimentaire chute rapidement.

Le topping consiste à faucher la pâture 1 à 2 jours avant le passage des animaux. Cela permet à la fois de nettoyer la parcelle et de repartir sur de belles repousses nutritives pour les prochains passages.

Le topping permet de couper proprement les plantes et de valoriser une partie des refus.

Guillaume VESSARD (Miribel les Echelles - 38)

Altitude : 740 m

19,3 ha de pâturage (42 ares/VL)

Pâturage jour et nuit, baisse de la complémentation

11 Kg de MS ingérée à la pâture

Pratique du topping

Hauteur moyenne : 8,4 cm

Croissance : 29 Kg de MS/ha/jour

GAEC COURTIAL (Coucouron - 07)

Altitude : 1150 m

12,7 ha de pâture au printemps (24 ares/VL)

Mise à l'herbe le 29 avril

13 kg de MS ingérée à la pâture


Hauteur moyenne : 8,5 cm

Croissance : 65 Kg de MS/ha/jour

12 juin
2023

Suivis de l'herbe

- 1 **GAEC de la Mure**
Biol - 500 m
- 2 **Guillaume VESSARD**
Miribel les Échelles - 740 m
- 3 **GAEC de Sully**
Varacieux - 420 m
- 4 **Jean-Luc BERTHOIN**
La Chapelle en Vercors - 880 m
- 5 **Paul BESSEAS**
Quintenais - 400 m
- 6 **GAEC COURTIAL**
Coucouron - 1150 m



Stations météo

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Bourgoin-Jallieu (358 m) | 7 La Chapelle-en-Vercors (879 m) | 12 Colombier-le-Jeune (566 m) |
| 2 St-Étienne-St-Geoirs (384 m) | 8 St-Christophe et le Laris (400 m) | 13 St-Agrève (1014 m) |
| 3 St-Laurent-du-Pont (410 m) | 9 Étoile-sur-Rhône (145 m) | 14 Issanlas (1264 m) |
| 4 Chatte (272 m) | 10 St-Sauveur-en-Diois (338 m) | 15 Aubenas-Lanas (265 m) |
| 5 Roissard (746 m) | | |
| 6 Villard-de-Lans (1027 m) | | |



Adice
Service - Conseil - Expertise

Vos Conseillers d'élevage Adice



BOVIN

- Pierre GONIN** - Nord Isère
06 30 63 23 40
- Patrick PELLEGRIN** - St Marcellin
06 71 00 37 18
- Mathilde VIAL** - Chartreuse / Valdaine
06 71 00 37 07
- Chloé GRILLOT** - Terres Froides Ouest
06 71 00 36 98
- Clément DIVO** - Terres Froides Est
06 71 00 37 10
- Alexandre ROBIN-BROSSE** - Bièvre
06 71 00 37 03
- Camille SCALVINI** - Vercors / Royan
06 25 41 19 58
- Yannick BLANC** - Nord Drôme
06 25 41 19 70
- Odile SEIVE** - Nord Ardèche
06 62 42 06 00
- Katleen PETIT** - Vallée du Rhône
06 62 42 08 16
- Jérémy CRESPIY** - Plateaux Ardéchois
06 26 36 41 28
- Philippe CHABANAS** - Vernoux
06 62 42 06 93



CAPRIN / OVIN

- Benoit DESANLIS** - Isère
06 30 63 23 19
- Aude PASQUET** - Nord Drôme / Vercors
06 76 91 90 99
- Mathilde CHAZALET** - Sud Drôme
06 25 41 19 74
- Priscillia CROUZET** - Nord Ardèche
06 62 42 06 44
- Lucas CLAUZIER** - Sud Ardèche
06 62 42 08 99