



	Stations météo au 30 avril 2023	Σ T°C depuis 1er février	Σ pluvio depuis 1er janvier
38	Bourgoin-Jallieu (358 m)	810	167 (+20)
	St-Étienne-St-Geoirs (384 m)	724	141 (+20)
	St-Laurent-du-Pont (410 m)	707	397 (+65)
	Chatte (272 m)	795	141 (+23)
	Roissard (746 m)	720	246 (+25)
	Villard-de-Lans (1027 m)	504	291 (+27)
26	Chapelle-en-Vercors (879 m)	612	266 (+28)
	St-Christophe Laris (400 m)	759	147 (+21)
	Étoile-sur-Rhône (145 m)	904	77 (+14)
	St-Sauveur-en-Diois (338 m)	809	109 (+17)
07	Annonay (336 m)	811	141 (+36)
	Colombier-le-Jeune (566 m)	753	95 (+15)
	St-Agrève (1014 m)	535	151 (+32)
	Issanlas-Peyrebeille (1264 m)	426	88 (+15)
	Aubenas-Lanas (265 m)	894	98 (+31)

Entre parenthèses : cumul de pluie sur les 15 derniers jours

Le coup de bourre du printemps

La pousse s'accélère nettement avec la fin des gelées et les conditions douces et humides. **Les récoltes d'herbe et les semis de maïs se généralisent en Plaine** quand la météo le permet !

En Montagne, l'herbe s'active aussi. On approche de la fin du déprimage (500°C) sur ces secteurs.



« Les plantes poussent plus en une nuit de mai qu'en dix d'avril »

Σ T°C



Stade de l'herbe

Prairies naturelles et temporaires

- 800-900°C : ensilage/enrubannage/foin séché, début épiaison
- 600 - 700°C : ensilage précoce, épi 10 cm
- 500°C : fin du déprimage et du 1^{er} tour de pâturage, épi 5 cm

Récolte de l'herbe en Plaine

Les RGI précoces en dérobés qui n'ont pas encore été récoltés sont maintenant à épiaison. Les autres RGI, les méteils et les prairies temporaires sont entre « épi 10 cm » et « dernière feuille pointante » selon les secteurs.



Objectif de stade de récolte en ensilage/enrubannage :

- Qualité + : récolte à épi 10-15 cm (haut du mollet)
- Équilibre : récolte à dernière feuille pointante (haut du genou)
- Stock : récolte à début épiaison (haut de la cuisse)



Méteil vesce-avoine-pois fourrager avant maïs dans les Terres Froides

Stade « dernière feuille pointante » de l'avoine le 28/04

=> Ensilage cette semaine pour assurer la valeur alimentaire

2 mai
2023

Implantation des maïs



Attention au ressuyage des parcelles avant de semer. Vérifier que la terre n'est pas gorgée d'eau sur les 15 premiers centimètres pour éviter de la compacter sous les roues du tracteur (très préjudiciable pour le système racinaire).



Levée du maïs semé la semaine de Pâques (11/04) sur le secteur du Nord-Isère

Prise de vue le 26/04

Le réseau de suivi de la pousse de l'herbe

GAEC DE SULLY (Varacieux - 38)

Altitude : 420 m

15,5 ha de pâturage (24 ares/VL)

Système herbe-maïs

Mise à l'herbe le 16 Mars

Hauteur moyenne 8,4 cm

Croissance : 63 Kg de MS/ha/jour

BERTHOIN Jean Luc (Chapelle en Vercors - 26)

Altitude : 880 m

14 ha de pâturage (38 ares/VL)

Système herbe-foin-enrubannage en AB

Mise à l'herbe au 5 avril sur des parcelles de fauche

Hauteur moyenne 5,9 cm

Croissance : 48 Kg de MS/ha/jour

GAEC DE LA MURE (Biol - 38)

Altitude : 500 m

27,5 ha de pâturage (42 ares/VL)

Système herbe-maïs en AB

Fermeture des silos. Pâturage jour et nuit

Hauteur moyenne : 8,6 cm

Croissance : 48 Kg de MS/ha/jour

BESSEAS Paul (Quintenas - 07)

Altitude : 400 m

13,8 ha de pâturage (34 ares/VL)

Système herbe-foin-ensilage en AB

Mise à l'herbe le 16 mars

Hauteur moyenne : 9,1 cm

Croissance : 36 Kg de MS/ha/jour

Guillaume VESSARD (Miribel les Echelles - 38)

Altitude : 740 m

19,3 ha de pâturage (42 ares/VL)

Système herbe-foin

Pâturage jour et nuit. Sol humide

Hauteur moyenne : 10,8 cm

Croissance : 90 Kg de MS/ha/jour

GAEC COURTIAL (Coucouron - 07)

Altitude : 1150 m

12,7 ha de pâturage au printemps (24 ares/VL)

Système herbe-foin-enrub-maïs épi

Les vaches pâturage sur les parcelles de fauche depuis le 29 avril

Hauteur moyenne : 9,2 cm

Croissance : 86 Kg de MS/ha/jour

Gestion du pâturage

La pousse de l'herbe s'est accélérée la semaine dernière, après un ralentissement vers la mi-avril (voir données en bas de page).

Les croissances actuelles sont d'environ 50-60 kg MS/ha/jour en Plaine : 1 ha de pâturage peut fournir la ration complète de 3 vaches (17 kg de MS/vache/jour).


Les graminées vont bientôt épier dans les pâtures, les zones de refus vont se développer. Avec de l'herbe au mollet, il faut prévoir de faucher :

- avant de lâcher les vaches dans la parcelle (topping) afin d'assurer une consommation régulière
- ou de faucher les refus après la fin du pâturage des animaux

2 mai
2023

Suivis de l'herbe

- 1 **GAEC de la Mure**
Biol - 500 m
- 2 **Guillaume VESSARD**
Miribel les Échelles - 740 m
- 3 **GAEC de Sully**
Varacieux - 420 m
- 4 **Jean-Luc BERTHOIN**
La Chapelle en Vercors - 880 m
- 5 **Paul BESSEAS**
Quintenas - 400 m
- 6 **GAEC COURTIAL**
Coucouron - 1150 m



- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Bourgoin-Jallieu (358 m) | 7 Chappelle-en-Vercors (879 m) | 11 Annonay (336 m) |
| 2 St-Étienne-St-Geoirs (384 m) | 8 St-Christophe et le Laris (400 m) | 12 Colombier-le-Jeune (566 m) |
| 3 St-Laurent-du-Pont (410 m) | 9 Étoile-sur-Rhône (145 m) | 13 St-Agrève (1014 m) |
| 4 Chatte (272 m) | 10 St-Sauveur-en-Diois (338 m) | 14 Issanlas (1264 m) |
| 5 Roissard (746 m) | | 15 Aubenas-Lanas (265 m) |
| 6 Villard-de-Lans (1027 m) | | |

Stations météo

Vos Conseillers Fourrages



Patrick PELLEGRIN
Secteur St-Marcellin (38)
06 71 00 37 18
patrick.pellegrin@adice-conseil.fr



Clément DIVO
Secteur Terres Froides Est (38)
06 71 00 37 10
clement.divo@adice-conseil.fr



Jérémy CRESPIY
Secteur Plateaux Ardéchois (07)
06 26 36 41 28
jeremy.crespy@adice-conseil.fr