Observer pour mieux pâturer

Note Patur'RA

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°2– semaine 12 – lundi 16 mars 2015

La Chapelle de Mardore 650M
Cumul température 01/02 :125°c
Vaches lâchées 3 h les après midi



Bibost- 400 M
Cumul température 01/02 : 200° c
4,2 cm dans les parcelles
Vaches lâchées 3h les après midi

St Martin en Haut 750 M
Cumul température 01/02 :135°

Villechenève-670M
Cumul température 01/02 :160°c

longes –400 M
Cumul température 01/02 :210°c

C'est reparti pour une nouvelle saison de suivi de croissance de l'herbe dans le Rhône.

Avec 7 à 8 j de retard sur une année moyenne, les prairies ont du mal à démarrer en ce début mars. Seules les zones les plus basses ou les mieux exposées voient un démarrage de végétation. Le vent du nord et le beau temps de la semaine dernière ont en revanche permis au sol de ressuyer (au moins en surface). Les interventions dans les parcelles battent leurs pleins avec notamment les apports d'azote .Sur les secteurs les plus chauds, le deuxième apport sur prairie ensilée doit avoir eu lieu pour respecter un délai suffisant entre l'épandage d'engrais et la récolte du fourrage. Sur les secteurs plus tardifs, profitez du beau temps annoncé cette semaine pour le réaliser.

Plaines et coteaux (< à 500m) : le repère des 250°c pour une mise à l'herbe précoce va être atteint cette semaine. Pour les élevages disposant d'une surface par vache importante (supérieur à 30 ares par vaches) la mise à l'herbe doit avoir lieu si la portance le permet. Pour les autres, seul un accès à l'extérieur une à deux heures par jour pour décharger le bâtiment est intéressant. Un tour de pâturage doit aussi vous permettre de vous rendre compte du stade de l'herbe dans vos parcelles ainsi que la portance du sol. Ces deux facteurs seront source de décision pour une mise à l'herbe réussie.

Monts du lyonnais et du beaujolais (> à 500m): La mise à l'herbe n'est pas d'actualité. Si les conditions se maintiennent on peut espérer un gain de 40°à 50°c par semaine, soit encore une quinzaine de jours pour préparer la sortie des animaux. Profitez de ces derniers jours pour terminer les derniers préparatifs (clôture, points d'eau, accès au pâturage)



Repères sommes de températures

- ✓ sur prairies fertiles type AB
  - o 250 à 350° : mise à l'herbe
  - o 500°c : fin du déprimage
  - o < à 600°c : fin du premier tour
  - o 700°c : fauche précoce ensilage enrubannage
- ✓ Sur prairies peu fertiles
  - o 350 à 450° : mise à l'herbe
  - o 650°c : fin du déprimage

Contact

Mickaël COQUARD
Port : 06 89 12 55 72
Mail : mickaelcoquard@cmre.fr
Note technique hebdomadaire - IPNS
SPEL – 18 Avenue des Monts d'Or
69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Maison de l'élevage DU RHÔNE