


23 mars
2020

Le point météo



	Station météo	Σ T°C depuis 1 ^{er} février	Σ T°C sur 8 derniers j	Σ pluvio depuis 1 ^{er} janvier	Σ pluvio sur 8 derniers j
07	Aubenas (250m)	475	82	176	0
	Colombier-le-Jeune (450m)	419	85	53	0
26	Lus-la-Croix-Haute (1000m)	251	58	170	0
	Combovin (350m)	338	65	108	0
	Romans sur Isère (150m)	448	80	76	0
	Chabeuil (200m)	464	83	80	0
38	St Etienne de Geoirs (400m)	380	73	116	0
	Chatte (250m)	419	78	128	0
	Bourgoin (250m)	457	91	103	0
	La Mure (900m)	232	51	158	0

Un printemps sec et précoce dans tous les secteurs

Des conditions idéales pour démarrer le pâturage

Le temps de la semaine passé a été propice à la mise à l'herbe. Les premières mesures de croissance de l'herbe montrent un **départ de la végétation en plaine et coteau proche des 50 Kg de MS par jour**. En Ardèche la croissance a été très hétérogènes suivant les parcelles de 0 à 45 Kg.

Au-dessus de 700 m la croissance est limitée, une mise à l'herbe est à réaliser si les parcelles sont bien exposées et que le tour de pâturage sur l'ensemble des parcelles demande au moins 15 jours.

Seules les deux stations météo de La Mure et Lus la Croix Haute n'ont pas atteint les 300°, valeur repère pour la mise à l'herbe.

Stade	Rdt MS	NDF	MAT	UFL	UFV	PDIN	PDIE	PDIA
RGI 25 à 35 cm épi 4 cm	1,2	393	228	1,07	1,04	135	82	25
RGI 40 à 50 cm épi 7 cm Ensilage laitier	2,5	437	196	1,04	1,00	118	77	21
RGI 50 à 60 cm épi 14 cm Ensilage équilibré	3,8	481	203	0,95	0,90	121	73	21
RGI 60 à 100 cm épi 26 cm Ensilage fibreux	5,1	547	203	0,92	0,86	120	70	19

Contact :
Patrick PELLEGRIN – patrick.pellegrin@adice-conseil.fr

Ça se passe à Estrablin (38)



Avec le beau temps la tentation a été forte de réaliser les ensilages. Dans l'ouest Isère, certains RGI mesuraient déjà plus de 50 de haut. Ainsi les RGI de l'Earl de la Gère à Estrablin (semis début sept. 2019, apport d'azote soufré début février à 220 kg/ha) ont été ensilé le 18 mars. Plus au sud, à Chevrières en bio, les RGI de 40 cm ont été aussi récoltés. Attention l'estimation du rendement est parfois surestimée à l'œil. Ainsi d'autres agriculteurs ont renoncé après un premier tour jugeant le volumes pas assez élevé pour payer l'ensileuse !

Surveiller les RGI

Bien que le temp plus frais de la semaine doit limiter la croissance, les RGI sont à surveiller pour ne pas rater la récolte.

Rappel des valeurs des RGI obtenus en 2019.

Pour une récolte en enrubannage, compter 0,1 UFL en moins

Mesures de croissance d'herbe 2020 : un démarrage précoce et important

Avec l'épidémie de coronavirus, les mesures de croissance d'herbe n'ont pas pu être réalisées sur tous les sites prévus.



GAEC FERME DE LA CASSOLE (St Didier de la Tour 38)

Altitude 410 m. 33 vaches

Mise à l'herbe : 4 Mars

14,5 Ha dont 5 Ha ont été déprimés (43 ares/VL)

Hauteur moyenne : 6,1 cm

Croissance : 64 Kg de MS



GAEC DE SULLY (Varacieux 38)

Altitude : 420 m. 66 vaches

18 Ha de pâturage (27 ares/VL)

Mise à l'herbe 14 mars

Hauteur moyenne 6.7 cm

Croissance : 48 Kg de MS/jour/Ha



Vaches laitières, allaitantes ou génisses, toutes de sortie

23 mars
2020

Guillaume VESSARD (Miribel les Echelles 38)

Altitude : 740 m. 46 vaches

19,31 Ha de pâturage (42 ares/VL)

Mise à l'herbe : 12 Mars

Hauteur moyenne : 7 cm

Croissance: 7Kg de MS

GAEC DE MALPERTUIS (Alboussière 07)

Altitude : 700 m. 43 vaches

19 Ha à pâturer (44 ares/VL)

Hauteur moyenne : 8.9 cm

GAEC DE POSEFOI (Peaugre 07)

Altitude 360. 36 vaches

12 ha à pâture (33 ares/VL)

Mise à l'herbe le 6 mars

Hauteur moyenne 6,4 cm

Croissance 7Kg de MS

Contact :

Patrick PELLEGRIN – patrick.pellegrin@adice-conseil.fr

