


## Somme de températures en °C depuis le 1<sup>er</sup> février au : 21/06/20

Bas-Vivarais		Pentes (Cévennes, Coiron, Boutières)		Haut-Vivarais		Montagne	
100 m	Fin des observations	400 m	Fin des observations	400 m	Fin des Observations	900 m	1 347
200 m	Fin des observations	500 m	Fin des observations	500 m	Fin des Observations	1000 m	1 259
300 m	Fin des observations	600 m	Fin des observations	600 m	Fin des Observations	1100 m	1 171
400 m	Fin des observations	700 m	Fin des observations	700 m	Fin des Observations	1200 m	1 084
500 m	Fin des observations	800 m	Fin des observations	800 m	Fin des Observations	1300 m	1 000

## Réserve en eau des sols au :

21/06/20



## Gestion de l'herbe : les stades repères en somme de températures

Type de prairie	Fauche précoce	Foin (épiaison)	Foin (floraison)
Prairie naturelle fertile, prairie temporaire	700°C	1000°C	1200°C
Prairie naturelle tardive	900°C	1200°C	1400°C
Prairie maigre	Inadaptée	1000°C	1200°C

## Croissance d'herbe mesurée sur les pâtures au :

18/06/2020

Exploitation	Commune	Mise à l'herbe	Croissance en kg de MS/ha/jour					
			14-mai	21-mai	28-mai	4-juin	11-juin	18-juin
GAEC de Posefoi	Peaugres (400 m)	07-mars	52	44	34	6	24	22
EARL de Malepertuis	Alboussière (730 m)	26-mars	30	18	21	10	26	17
Gaec Belledent	Coucouron (1170 m)	28-avr.	60	38	31	48	42	16

**Observations :** C'est la fin du temps de l'herbe sauf en montagne. Après un printemps de nouveau compliqué, c'est l'été qui s'installe avec l'équinoxe. Seuls les secteurs d'altitude (1000 m et plus) vont garder des températures propices à la pousse de l'herbe. Ailleurs les températures moyennes vont dépasser les 18°C voire 24°C en zone basse. Les prairies permanentes valorisent mal les températures moyennes supérieures à 18°C et les graminées s'arrêtent de pousser au-delà de 25°C.

Le temps se met au beau partout : le soleil devrait briller sauf légère dégradation orageuse prévue dimanche prochain, mais qui ne devrait occasionner que peu de précipitations. A surveiller toutefois.

En montagne le stade des prairies a encore progressé : on est au-delà de floraison à 1000 m, et en pleine épiaison à 1300 m.

La situation hydrique reste confortable pour les sols moyens à profonds en montagne et quelques secteurs des Cévennes ou des Boutières. Ailleurs c'est la sécheresse qui s'installe ou qui est déjà bien installée.

## **Préconisations :**

**Au pâturage :** les croissances d'herbe diminuent partout y compris en montagne, mais elle est restée encore correcte pour la saison sur le nord Ardèche : en profiter sans excès. Restez vigilant en laissant toujours au moins 5 cm de hauteur d'herbe pour ne pas pénaliser la pérennité de la végétation. En montagne le tassement de la pousse peut être dû au stade : ce phénomène est souvent constaté à partir de 1000-1100°C (début des foins). Pour faire face, on peut offrir des surfaces neuves : repousses derrière ensilage/enrubannage (dès 3 semaines après la fauche) ou alors opter pour des prairies/pelouses maigres qui restent appétentes en adaptant la complémentation azotée de la ration (tourteau).

## **Parcelles à stocks :**

En altitude (1300 m), le stade foin précoce est là. On peut adopter plusieurs stratégies. Soit faucher maintenant pour faire un fourrage de qualité, car les conditions météo sont favorables. Cependant dans les systèmes extensifs (broutards, vache laitière à 4000-4500 l) et après deux années difficiles pour les stocks, on peut choisir de faucher tard à 1200 voire 1400 °C pour maximiser la quantité de fourrages récoltés, sachant que l'eau est encore disponible dans les sols. ATTENTION cependant : ces fourrages seront d'une valeur moyenne à faible y compris sur prairie tardive. Pour les sols superficiels, préférer toutefois faucher sans tarder car ils seront très vite sec en l'absence de pluie annoncée. Pour les éleveurs qui ont enrubanné tôt des prairies temporaires, prévoir la seconde coupe environ 40 jours après la première : les conditions ont été favorables pour des regains en quantité : la fauche très précoce se trouve payante en termes de volume et de qualité du fourrage.

**Votre avis nous intéresse : une observation, une erreur, une question, contactez-nous (06 85 10 09 96) !**

## **Visite « bout de champ » Mercredi 24 juin à partir de 13h30 Ferme du Pré de Mazan**

**Echange avec Camille et François sur leurs pratiques de pâturage  
Présentation de la typologie des prairies du Massif Central : quelle flore pour quelle utilisation ?  
Un exemplaire de la typologie sera remis aux participants à l'issue de la visite.**