



Tendances des fourrages d'herbe 2013 - Région RAA, Bourgogne et Franche-Comté

MS	MM	MAT	CB	NDF	Ca	P	Mg	UFL	UFV	PDIN	PDIE
% MB	%MS	g/Kg MS	/MS	/MS	g/KgMS	g/KgMS					

ensilage de RGI 1ère coupe

nombre d'analyses	66					31						
minimum	14,9	4,6	53	180	455	3,9	1,7	0,8	0,57	0,47	32	51
maximum	60	12,3	213	390	753	9,3	4,5	1,4	0,96	0,92	128	92
moyenne	29,3	9,1	133	290	586	5,1	3,2	1,0	0,74	0,67	78	71
écart-type	9,6	2,0	36	46	56	1,0	0,6	0,1	0,09	0,10	21	9
rappel moy 2012	32,9	9,1	136	280	569	5,3	3,1	1,2	0,76	0,68	80	72

ensilages de prairies naturelles de plaine 1ère coupe

nombre d'analyses	17					8						
min	23,1	4,7	85	249	554	3,8	1,4	0,8	0,53	0,42	49	55
max	68,8	15,5	209	384	748	12,4	4,0	1,4	0,89	0,83	125	85
moyenne	41,7	9,0	135	311	638	6,1	2,5	1,1	0,70	0,61	80	69
écart-type	16,1	3,6	39	35	44	2,8	0,9	0,2	0,10	0,11	23	10
rappel moy 2012	44,9	8,8	130	304	606	5,3	2,8	1,5	0,73	0,64	77	69

ensilage de luzerne 1ère coupe

nombre d'analyses	12					9						
minimum	22,4	7,1	144	285	—	9,0	2,2	0,9	0,54	0,43	75	65
maximum	24,0	11,1	191	409	—	16,2	2,8	1,2	0,72	0,62	99	77
moyenne	23,2	8,5	164	338	—	14,1	2,5	1,1	0,62	0,51	85	71
écart-type	0,5	1,2	16	35	—	2,2	0,2	0,1	0,06	0,06	8	5
rappel moy 2012	39,7	9,3	180	290	500	13,8	3,1	1,6	0,70	0,61	97	75

ensilages de trèfle violet 1ère coupe

nombre d'analyses	4					3						
min	23,7	6,7	161	266	492	10,1	2,6	1,4	0,66	0,58	84	76
max	52,0	13,6	185	311	518	10,7	3,1	1,6	0,76	0,68	97	78
moyenne	32,6	9,1	169	295	504	10,4	2,9	1,5	0,70	0,62	88	77
écart-type	13,3	3,1	11	21	12	0,3	0,2	0,1	0,04	0,04	6	1

foin de prairie naturelle de plaine 1ère coupe

nombre d'analyses	8					6						
minimum	61,3	5,67	53	238	58	2,5	1,8	0,7	0,55	0,44	33	54
maximum	92,7	11,1	181	361	583	6,4	3,5	2,3	0,84	0,77	113	98
moyenne	82,9	7,8	115	301	297	4,4	2,3	1,4	0,71	0,62	72	77
écart-type	9,9	1,9	39	46	253	1,3	0,7	0,7	0,11	0,12	25	14
rappel moy 2012	87,5	7,0	105	319	613	4,1	2,2	1,2	0,67	0,58	66	73