



La Chapelle de Mardore 650 M


Cumul température 01/02 :547°c
Croissance hebdomadaire : 25 kg(33kg sur 15j)
5-6kg de foin à l'auge

Pomeys-650 M

Cumul température 01/02 :637°c
Croissance hebdomadaire : 34kg (37kg sur 15j)

Grammond-800 M

Cumul température 01/02 :586°c



Bibost- 400 M

Cumul température 01/02 : 688° c
Croissance hebdomadaire : 31kg(34kgsur 15j)
Ensilage des rgi prévu 29/04

Coise 650 M

Cumul température 01/02 :637°c
Croissance hebdomadaire : 38kg(32kg sur 15j)
30% d'herbe pâturé dans la ration

St jean de touslas -250 M

Cumul température 01/02 :755°c
Croissance hebdomadaire : 20kg (21kg sur 15j)



Une sécheresse de printemps hors norme caractérise ce début de saison. La croissance est encore cette semaine en déficit de 50%.

Avec 30kg en moyenne sur le département la croissance permet d'alimenter seulement 2 vl/ha. Elle est inférieure de 50% par rapport à une année normale. La complémentation en fourrage à l'auge doit être à minima maintenue. Dans le cas d'absence de stock d'ensilage, du foin et du concentré peuvent être distribuer la nuit. Si le stock d'herbe sur pied est faible, le temps de présence au pâturage doit être limiter. Il est important de ne pas consommer plus d'herbe que les prairies en produisent. L'avenir du potentiel en dépendra quand la pluie sera de retour. Contrairement aux autres années, il faut essayer de maximiser la croissance en évitant de pâturer trop ras. Si la pluie arrive, il faudra en revanche être très vigilant à l'explosion de l'herbe. Un tour de parcellaire dans les jours qui suivront la pluviométrie sera impératif pour juger de l'avancement du stade

Pâturage génisses : avec les croissances de ces dernières semaines, même les génisses ne sont pas débordées. Pour essayer de maximiser la pousse, le pâturage tournant peut être mis en place. Le déprimage des parcelles à feuilles fines (fétuque ovine, fétuque rouge cretelle etc) notamment sur les versant nord, peut encore être réalisé. Il conviendra juste de ne pas surpâturer et de vérifier que les épis ne sont pas consommés par les animaux

Ensilage d'herbe :

Les stratégies de récolte seront différentes d'une exploitation à une autre et d'une prairie à une autre. Dans tous les cas, la question de l'équilibre du bilan fourrager doit être poser. Ensilage d'herbe laitier, intermédiaire ou fibreux tels seront les choix qui se proposent à vous. Sur une exploitation plusieurs stratégies pourront être mis en place. Sur les prairies à graminée (type rgi), si l'ensilage est destiné aux vaches laitières, la récolte doit intervenir avant épiaison. Si la pluie arrive cette fin de semaine, l'avancée des stades risquent d'être rapide. Sur les prairies à base de légumineuses, la valeur nutritive décroît plus lentement. On pourra alors viser une stratégie « stock » sans avoir une chute importante de valeur nutritive.



Source CA 58

Rédaction :
Mickael COQUARD
06 89 12 55 72
mickaelcoquard@cmre.fr

Publication :
Laetitia CANONIER
06 25 90 33 38
laetitia.canonier@rhone.chambagri.fr

Note technique hebdomadaire – IPNS RTE– 18 Avenue des Monts d'Or
69890 LA TOUR DE SALVAGNY