




Patur'RA, Observer pour mieux pâturer un réseau Régional pour faciliter vos décisions





La Chapelle en Vercors, Bio, prairies naturelles et PME



ça ralentit aussi dans la Drôme
Seulement **22 kg de MS** /hectare /jour dans le Vercors et **37** au Lycée Agricole du Valentin en plaine cette semaine !... Dans la Drôme, la pousse a baissé et elle est du même niveau que celle de début juin 2011.
En plaine, beaucoup de foin ont été récoltés, en montagne, c'est le bon stade pour récolter des fourrages encore assez jeunes.

Lycée Agricole du Valentin, Bio, prairies multi-espèces



Conseils gestion de l'herbe en 2013

En plaine, les surfaces qui ont pu être récoltées précocement peuvent rentrer dans le pâturage
En montagne, selon les exploitations (date de mise à l'herbe, chargement, portance des sols...), les situations sont très différentes. Si vous avez une grande surface par animal et que les premières parcelles sont bientôt bonnes à pâturer de nouveau, récolter une partie des excédents de pâturage en même temps que les premiers enrubannages. Au contraire, si l'herbe a peu repoussé sur les premières parcelles, pâturez des parcelles même lorsque l'herbe est haute (> 20 cm). Avec les températures actuelles plus clémentes, un apport de lisier ou d'engrais azoté stimulera la pousse et sera bien valorisé sur vos prairies à base de graminées.

Lundi 10 juin 2013
Patur'RA n° 10
Jean Pierre Manteaux
04.75 70 69 34 06 22 42 53 88

Cette année, entre les excès d'eau et les gelées tardives, les ensilages et les enrubannages d'herbe seront de qualité très variables : pensez à réaliser une analyse pour caler plus facilement vos futures rations