



Patur'RA, Observer pour mieux pâturer un réseau Régional pour faciliter vos décisions



Semis de méteils ou pas ?

2013 comme les années précédentes montre l'intérêt de diversifier son système fourrager pour sécuriser la production fourragère, en quantité mais aussi en qualité.

La récolte 2013 des ensilages de sorgho et du maïs grain, perturbée par les fortes précipitations de l'automne, a été tardive et certains éleveurs de plaine se posent la question de semer maintenant les céréales ou les méteils.

2 raisons pour semer des méteils maintenant :

1. Les suivis réalisés chez les éleveurs nous ont montré les années précédentes que les rendements en méteil fourrage étaient corrects même avec des semis tardifs.
2. la disponibilité en semences de maïs risque d'être faible en 2014 : beaucoup d'hectare supplémentaires prévus en maïs en 2014 alors que la production de semences est faible cette année (-20 % dans la Drôme et problèmes de récolte aussi dans les pays de l'est)

Préconisations habituelles pour les méteils (kg / ha)

	Triticale	Blé	Avoine	Vesce Commune	Pois Fourrager
méteil Bovins (ensilage ou BRE)	60	20	50	20	30
méteil caprins (foin)			75	25	25
méteil grain	130				30

Augmenter les doses de 25 % en novembre 2013



Les préconisations fin novembre 2013 (avec la contribution de Michel Mangin, Arvalis-Institut du Végétal)

1. Garder équilibre céréales / légumineuses habituel, voire surdoser légèrement la vesce (+10%)
2. Choix des céréales : **Triticale** reste le tuteur de base, maintenir le **Blé**. L'Orge non préconisée habituellement est à proscrire vu les dates de semis. L'**Avoine** ? : vous pouvez diminuer sa proportion au profit de triticale/blé, voire semer un méteil grain plutôt qu'un méteil caprin.
3. Variétés de Triticale : Tribeca, Rotego, Trimour, éviter Bienvenu à cette date
4. Augmenter les doses de semis conseillées : **+25 %**
5. Semis à 3 cm de profondeur maxi pour favoriser la levée

Eviter le matraquage des sols :

1. pas de désherbage des céréales pures si pas de portance
2. pour semis de méteil ou céréales : préparer le sol et si manque de portance, semer le matin par -3 ou -4 ° C quand le sol porte mieux

Mardi 26 novembre 2013

Patur'RA n° 15

Jean Pierre Manteaux 04.75 70 69 34 06 22 42 53 88
jmanteaux@drome.chambagri.fr

Derrière un méteil récolté en fourrage, du sorgho BMR pourra être semé fin mai-début juin 2014

