


Bassin annécien
Poisy - 450m
Croissance : 90 kg MS/ha/jour
Mise à l'herbe le 28 mars
81 VL – 28 ares/VL

Albanais
Marigny St Marcel - 400m
Croissance : 52 kg MS/ha/jour
Mise à l'herbe le 20 mars
44 VL – 38 ares/VL

Avant Pays - Ayn - 550m
Croissance : 30 kg MS/ha/jour
Mise à l'herbe le 13 mars
33 VL – 40 ares/VL



Plateau Gavot
Vinzier - 900m
Croissance : 78 kg MS/ha/jour
Mise à l'herbe le 7 avril
36VL – 35 ares/VL

Bornes - Groisy - 700m
Croissance : 46 kg MS/ha/jour
Mise à l'herbe le 18 mars
33VL – 35 ares/VL

Massif des Bauges
Puygros - 800m
Croissance : 74 kg MS/ha/jour
Mise à l'herbe le 7 avril
46VL – 40 ares/VL

Mis à jour au 31 mai

Altitude	Station et altitude	Som t°C	Moyenne
200 - 400 m	CHAMBERY-AIX - 235	1160	1145
	MONTMELIAN - 267	1194	
	ALBERTVILLE JO - 335	1224	
	LAC AIGUEBELETTE - 375	1094	
	THONON-INRA - 376	1054	
400 - 600 m	BONNEVILLE - 450	1011	1074
	USINENS SA - 452	1124	
	MEYTHET - 458	1059	
	STE MARIE CUINE - 460	1151	
	DOUVAIN SA - 470	1101	
	GIEZ - 478	997	
600 - 1000 m	ST MICHEL MAUR - 698	1064	927
	EVIAN SA - 725	862	
	BOURG ST MAURICE - 865	1000	
	CHAPELLE SAINT-MAURICE - 970	781	
+ 1000 m	CHAMONIX - 1042	725	570
	FREJUS - 1228	678	
	LE GRAND-BORNAND - 1430	447	
	MONT DU CHAT - 1496	459	
	LE TOUR - 1500	543	

Cette semaine :

A moins de 1000m,
Avec la nouvelle période de beaux temps, les 1ères coupes sont maintenant bien avancées voire terminées chez certains.

En termes de stades, le dactyle et la fétuque élevée sont en début floraison à 700m. Il est donc temps de finir le foin des vaches laitières. Les parcelles déprimées sont un peu moins avancées et permettent de faire du foin de qualité, même tardivement.

A plus de 1000m,
Les montées en montagnettes et alpage sont en cours. Avec les températures de la semaine dernière, la pousse de l'herbe s'accélère. N'oubliez pas qu'il vaut mieux attendre un peu l'herbe pour pâturer de la qualité plutôt que d'être dépassé !

Grâce à 5 jours de beaux temps successifs, les faucheuses et les presses étaient de sorties cette fin de semaine. A moins de 600m cette coupe aura donc été faite entre 1100 et 1200° soit le stade floraison du dactyle et de la fétuque. Il faudra attendre les analyses pour parler des valeurs alimentaire.

En ce qui concerne les croissances, les parcelles de fauches repartent plus ou moins forts en fonction de la flore. Malgré l'humidité des sols et le soleil, la croissance est freinée par la fraîcheur des nuits. Il fait encore moins de 10° le matin.

En bas, la croissance stagne autour de 50 kgMS par hectare et par jour. Avec ces croissances plutôt calmes, évitez à tout prix le surpâturage. Si la hauteur d'entrée du parc suivant n'est pas à 10cm, il faut distribuer du fourrage à l'intérieur pour laisser plus de temps de repousses et permettre aux prairies de refaire leurs réserves.

Plus haut la pousse reste à des valeurs élevées (70 à 80 kgMS), les stocks d'herbe d'avance vont se reconstituer.