






Pâtur'RA, Observer pour mieux pâturer un réseau Régional pour faciliter vos décisions



Fin avril 2014, pousse normale

Fin avril au LA Valentin, la pousse de **62** kg MS/ha/jour et le chargement élevé (20 ares / UGB) permettent de couvrir une part importante d'herbe pâturée dans la ration : 10 kg de MS / UGB / jour.

En montagne, à la Chapelle en Vercors, la pousse de **74** kg de MS/ha/jour marque un 1° pic en 2014.

Sur tout le département de la Drôme, la somme des températures reste très en avance : le Nord Drôme a dépassé les 800°. En montagne, les 500° sont dépassés. Ces sommes de température correspondent toujours à une semaine d'avance par rapport à 2012.

Conseils gestion de l'herbe

En plaine, programmer les coupes précoces dès que l'épisode pluvieux s'arrête. Réduire la complémentation dans le bâtiment pour maximiser l'ingestion de la pousse au pâturage.

En montagne, les retardataires doivent lâcher rapidement les animaux, et avec une pousse de + de 70 kg de MS par jour, ils devront faire une transition rapide.

Pour ceux qui ont lâché tôt, le pâturage de nuit et le niveau de complémentation au bâtiment se décidera d'ici mi-mai en fonction de l'évolution de la pousse et des températures nocturnes.

RAPPEL visites « Améliorer l'Autonomie Alimentaire » de ce printemps 2014:

Mercredi 30 avril : St Auban sur Ouveze, démonstration pose de clôtures

Davantage de détails sur www.synagri.com/drome

cumul depuis 1° février	
Somme de température	27/04/14
DIVAJEU	892
VALENCE-CHABEUIL	872
ROMANS	877
ALBON	857
ST-JEAN-EN-ROYANS	820
ST-CRISTOPHE-LARIS	802
ST ROMAN-DIOIS	794
BOURDEAUX	763
ST-AUBAN	695
COMBOVIN	593
CHAPELLE-EN-VERCORS	538
SEDERON	538
LUS LA CROIX HAUTE	502

Mardi 29 avril 2014

Pâtur'RA n° 4

Jean Pierre Manteaux

04.75 70 69 34 06 22 42 53 88

	Cumul de t° depuis 1° février	2012	
		Lus la croix haute	Chabeuil
Mise à l'herbe	300 °C	04/avr.	21/mars
Fin déprimage	500 °C	03/mai	06/avr.
Fin premier tour de pâturage	600 °C	11/mai	15/avr.
Fauches précoces (ensilage, enrubbage, séchage en grange)	700-800 °C	22 au 29 mai	25 avril au 1° mai
Foin précoce (recherche de qualité)	950-1000 °C	6 au 11 juin	10 au 14 mai