





Pâtur'RA, Observer pour mieux pâturer

un réseau Régional pour faciliter vos décisions



Cumul observé au 2 juin 2012	somme de températures	pluviométrie
	depuis 1° fevrier	
	°C	mm
LUS-LA-CROIX-HAUTE	871	358
COMBOVIN	951	400
ROMANS-SUR-ISERE	1321	234
CHABEUIL	1313	241
REPERES		
Fauches précoces (ensilage, enrubbage, séchage en grange)	700-800	
Foin tardif	1100-1200	

La pousse de l'herbe identique en plaine et montagne
 Maintien de la pousse en montagne où elle atteint **68** kg de MS/ha / jour à La Chapelle en Vercors alors qu'en plaine elle est de **67** kg de MS à Bourg les Valence !
Somme des températures depuis le 1° février:
 900° en montagne (stade récolte précoce) et plus de 1300 en plaine



Conseil de la semaine : sortez les faucheuses
 Avec 70 kg de pousse par hectare et par jour, et 20 ares / VL, la pousse est de 14 kg de MS / VL / jour : **pousse et ingestion doivent s'équilibrer**, le stock d'herbe à pâturer doit être stable. Début juin est la période où les épis peuvent contrarier le pâturage
En montagne: avant de faire pâturer une herbe avancée, surveiller la hauteur d'herbe sur les premières parcelles pâturées. Le 2° cycle devrait commencer.
 En **plaine**, diminuer la surface pâturée si la hauteur de l'herbe offerte est de 20 cm. Faucher ces parcelles dès cette semaine. Le 3° passage devrait commencer début juin.

Mardi 5 juin 2012
 Pâtur'RA n° 10
 Jean Pierre Manteaux 04.75 70 69 34
 06 22 42 53 88

