




Pâtur'RA, Observer pour mieux pâturer

un réseau Régional pour faciliter vos décisions




Cumul observé au	somme de températures	pluviométrie
19/05/12	depuis 1° février	
	°C	mm
LUS-LA-CROIX-HAUTE	670	268
COMBOVIN	735	313
ROMANS-SUR-ISERE	1077	176
CHABEUIL	1072	182
REPERES		
Fauches précoces (ensilage, enrubannage, séchage en grange)	700-800	
Foin tardif	1100-1200	

La pousse de l'herbe reste élevée...

Maintien de la pousse aussi bien en plaine qu'en montagne: elle atteint **94** kg de MS/ha / jour à La Chapelle en Vercors et encore **89** kg de MS à Bourg les Valence.

Somme des températures depuis le 1° février:

700° en montagne (stade récolte précoce) et bientôt 1100 en plaine



Conseils de la semaine

En montagne: maximiser l'ingestion à la pâture. Eviter de faire durer trop longtemps le 1° passage : surveiller la hauteur d'herbe sur la première parcelle pâturée. Les parcelles non pâturées seront fauchées avec les enrubannages précoces.

En **plaine**, avec le maintien d'une pousse forte, **favoriser l'ingestion des animaux en réduisant les stocks distribués, et** diminuer la surface pâturée. Sur ce 2° passage, le temps de repousse ne devrait pas dépasser 20 jours. Les parcelles non pâturées en mai devront être fauchées le plus tôt possible, avec les foins précoces.

Mardi 22 mai 2012

Pâtur'RA n° 8

Jean Pierre Manteaux 04.75 70 69 34
06 22 42 53 88

