


15 février
2021

Le point météo : les 200° jour sont atteints



	Station météo	Σ T°C depuis 1 ^{er} janvier	Date prévisionnelle des 200°C
07	Colombier-le-Jeune (450m)	173	18/2
	St Agrève (1000m)	86	14/3
	Aubenas (250m)	200	10/2
26	Romans sur Isère (150m)	200	7/2
	Chabeuil (200m)	188	16/2
	ST Jean en Royans (300m)	185	16/2
88	St Etienne de Geoirs (400m)	182	17/2
	Chatte (250m)	178	18/2
	Bourgoin (250m)	184	17/2
	La Mure (900m)	123	28/2

Les 200° pour l'épandage de l'azote sont atteints sur pratiquement toutes les zones de plaine et coteaux
<http://www.datenprairie.arvalis-infos.fr/>

Bilan Pâtu'RA 2020, un mauvais cru

Le printemps chaud et sec l'an dernier a limité l'explosion de la croissance de l'herbe au printemps et le rendement. La teneur en MAT de l'herbe était aussi plus faible.

ARDECHE : en plaine la croissance a été faible au printemps, mais plus explosive en montagne. La durée du pâturage a été courte de fin mars à fin juin en plaine, et de début mai à mi juillet en montagne. Le rendement moyen des parcelles pâturées a été de 3T de MS.

VERCORS DROME : bon début de pâturage, mais vite stoppée par la sécheresse. La mise à l'herbe à lieu mi avril. Le rendement des parcelles pâturées a été de 3T4 de MS.

ISERE : Après un démarrage très précoce en mars, la pâture s'est maintenue jusqu'à début juillet sans réelle explosion (croissance maximum de 50 à 60 kg MS/ha/jour. Le rendement des parcelles pâturées a été entre 4 et 4,5 TMS/ha en baisse par rapport aux années précédentes.

Contact :
Patrick PELLEGRIN – patrick.pellegrin@adice-conseil.fr

Réaliser vos apports d'azote sur prairies

2020 était une année très précoce. Le démarrage en 2021 est plus conforme aux moyennes. Autour du 20 février les 200° seront atteints en plaine et coteaux. **Dés que le sol porte, l'apport d'azote est à réaliser.** Après les pluies de l'hiver, il faut s'attendre à un départ en végétation rapide dès l'augmentation des températures.



L'azote apporté à 200° sera le mieux valorisé pour le rendement des graminées. Cette année vu le prix des tourteaux, pour des apports supérieurs à 70U d'azote sur prairies, un fractionnement en deux apports à un mois d'intervalle permettra d'augmenter la MAT du fourrage. Pour les pâturages un apport de 30 à 50 U est à réaliser si la pousse de l'herbe au printemps est maîtrisée, car cet apport augmentera la vitesse de croissance. Si la pousse de l'herbe est d'ordinaire trop importante au printemps, préférer un apport après le 1° ou 2° passage de pâture.

Happygrass, votre assistant prairies

L'outil 100% prairies, 100% éleveurs : enregistrez, valorisez, décidez.

Cet outil vous permet de Tenir à jour votre **Calendrier de pâturage**, Saisir des interventions (fertilisation, récolte, ..) et hauteurs d'herbe, Enregistrer les rations. Le Bilan de saison permet de calculer les croissances et rendements par parcelle, les jours de pâture, ..). Les applications associées vous aident dans vos prises de décision. **Adice est distributeur des solutions Happygrass** (www.happygrass.fr) né d'une collaboration entre les Conseils Elevage et l'Institut de l'Elevage.

