

Cumuls des températures au 07/04/2019 (source météo France)

Bas-Vivarais (Sud 07, Cévennes, Coiron)		Moyen/Haut-Vivarais (Nord07, Centre07, Boutières)		Montagne (>900 m de Laveyrune à Lalouvesc)	
200 m	581°C	400 m	509°C	900 m	385°C
400 m	508°C	500 m	472°C	1000 m	342°C
600 m	429°C	600 m	432°C	1100 m	311°C
800 m	350°C	700 m	393°C	1200 m	275°C
1000 m	274°C	800 m	355°C	1300 m	240°C
Gain/semaine	64°C	Gain/semaine	57°C	Gain/semaine	32°C
Avance/2018	10 jrs	Avance/2018	12 jrs	Avance/2018	16 jrs

Cumuls de précipitations du 01/04/19 au 07/04/19

Bas-Vivarais (Sud 07, Cévennes, Coiron)		Moyen/Haut-Vivarais (Nord07, Centre07, Boutières)		Montagne (>900 m de Laveyrune à Lalouvesc)	
Privas	30 mm	Annonay	13 mm	St Agrève	21 mm
Berzème	29 mm	Tournon	34 mm	Borée	21 mm
St Maurice d'Ibie	21 mm	St Félicien	34 mm	Laveyrune	53 mm
Antraigues	46 mm	Vernoux	35 mm		
Sablières	58 mm	Le Cheylard	14 mm		

Observations : La semaine dernière a été marquée par le retour du froid en particulier en altitude, et des précipitations ont touché le département mercredi et samedi avec des cumuls très variables suivant les secteurs.

Préconisations

Sur le Bas-Vivarais : le stade de l'herbe avance, et la mise à l'herbe peut intervenir jusqu'à 800 m. La pâture doit représenter l'essentiel de la ration des animaux sur les zones basses (jusqu'à 400 m) car le stade 500°C est atteint. Le stade 730°C synonyme d'ensilage/enrubannage, devraient être atteint d'ici le 22/04 en zone basse (200-300 m).

Sur le Haut et Moyen Vivarais : on est au stade mise à l'herbe à 800 m d'altitude. A 400 m on atteint 500°C seuil du déprimage et passage à la ration de plein printemps : si les surfaces sont suffisantes (30 ares/VL en prairie permanente), l'herbe pâturée doit représenter l'essentiel de la ration des animaux. Les précipitations ont été très faibles sur la partie nord (région d'Annonay). Pour ceux qui disposent d'irrigation en quantité suffisante, il est possible de mettre un passage d'eau de 30 mm en particulier sur les ensilages (RGI). Sur les autres secteurs les précipitations ont été suffisantes à priori (>30 mm) : l'irrigation ne semble pas nécessaire.

Sur la Montagne : la semaine a été marquée par un recul des cumuls de températures, situation qui devrait persister cette semaine. Malgré tout sur les prairies fertiles (p. temporaires, p. naturelles à ray grass anglais voire coucude) envisager la mise à l'herbe si vous êtes en zones basses (jusqu'à 1100 m). Pour les prairies moins fertiles garder le repère de 400°C.

Les bottes pour gérer la hauteur d'herbe



Pâturage : évaluer la quantité d'herbe disponible dans vos parcs.

Quand la hauteur d'herbe se situe entre le talon et la cheville, c'est le stade idéal pour la mise à l'herbe. A mi botte il y a déjà trop d'herbe : elle ira plus vite que les vaches et les chèvres.

Plus la surface à pâturer est grande plus il est important de rentrer tôt (herbe au talon). Votre conseiller d'élevage peut vous aider à évaluer l'herbe disponible avec des mesures à l'herbomètre.