



La pluie perturbe les chantiers de récolte, voire le pâturage

En plaine, les 1300° sont dépassés. Les pluies orageuses perturbent les fenaisons : dans les exploitations caprines très peu de foin de luzerne ont été récoltés en 1ère coupe. Dès que la période orageuse sera passée, il faudra faucher très rapidement.

En montagne, le cumul de température a passé les 900°. Après la vague d'orage, les prairies temporaires précoces destinées à la production laitière, devront être rapidement enrubannées ou récoltées en séchage en grange.

Plaine 2018, début juin, tester le topping

La pousse est de **69 kg de MS/ha/jour en moyenne sur les 3 exploitations suivies**

Nous sommes dans la transition printemps -été. **Les pluies et la chaleur 2018 favorisent la pousse début juin.**

Au pâturage, pour favoriser la constitution de stocks sur pied, dans les parcelles épiées, faucher les refus ou mieux faites du topping, c'est ce qui favorise le plus le redémarrage de la pousse

Pour les luzernes, ceux qui ont ensilé ou enrubanné, pour eux ou par des voisins en achat sur pied, profitent de la forte pousse actuelle : les 2ème coupes seront réalisées en juin (viser 35 à 40 jours entre les coupes).

Tableau 1 :
Température et précipitations
sur Drôme Isère en 2018

Altitude	23 stations Drôme-Isère	Cumul le 3 juin 2018	
		températures °C depuis 1° février	pluviométrie mm depuis 1° janvier
158	ROMANS sur Isère	1420	407
175	DIVAJEU	1412	469
220	GRENOBLE le Versoud	1405	498
163	VALENCE-CHABEUIL	1403	392
153	ALBON	1380	351
295	Vienne REVENTIN	1362	337
308	ST-JEAN en Royans	1321	477
358	BOURGOIN	1307	355
272	CHATTE	1303	415
545	ST ROMAN en Diois	1266	559
400	ST-CHRISTOPHE Le Laris	1253	467
416	BOURDEAUX	1234	567
384	ST Etienne de st GEOIRS	1188	369
446	ST AUPRE	1169	672
625	ST-AUBAN sur Ouveze	1128	559
820	COMBOVIN	994	605
824	SEDERON	946	646
879	La CHAPELLE en Vercors	897	564
885	LA MURE	910	519
950	ST-PIERRE-LES EGAUX	874	855
1059	LUS la CROIX Haute	866	657
1027	VILLARD DE LANS	799	552
1564	ST CHRISTOPHE EN OISANS	663	474

En montagne,

la pousse de cette semaine est du même ordre qu'en plaine, **70 kg de MS/ha/jour en moyenne sur Vercors et Chartreuse**. Ceux qui ont des terres portantes, avec un pâturage jour et nuit, les vaches maximisent l'ingestion d'herbe pâturée.

Pour les terres qui manquent de portance, sortir les vaches le ventre vide, **4 à 5 heures**, puis les retirer de la parcelle peu portante. En limitant le temps de présence, on limite les dégâts liés au piétinement. Les vaches s'adaptent en passant beaucoup de temps à brouter.



Drôme Isère

Résultats des 5 suivis de pâturage en Drôme Isère en 2018

Chambre d'Agriculture et Conseil Elevage

04/06/18 Page 2

Gaec de SULLY, Chambarrans, CROISSANCE de la semaine **65 kg MS /ha /jour**. 232 grammes de concentrés par litre de lait

L'herbe pâturée représente **7,7 kg de MS/VL/jour**. Le chargement est de **25 ares / VL**.

Beaucoup de plantes de dactyles sont épiées, cette semaine le topping va être pratiqué

Earl de PLAMBOIS à St Didier de la tour,

CROISSANCE de la semaine **74 kg MS /ha /jour**

Sur la journée, les vaches consomment **10 kg MS d'herbe**.

Hauteur moyenne **8,6 cm**. Production de la semaine : **23,1 l/VL/j** et **93 g/l** de concentrés

Les vaches tournent rapidement, 1 seule parcelle a permis de calculer la croissance cette semaine

L. A. du Valentin à Bourg les Valence,

CROISSANCE de la semaine **67 kg MS /ha /j**. Les VL pâturent **+ de 12 kg** de MS par jour.

Entre **24 et 25 l / VL**

Guillaume Vessard, Chartreuse

CROISSANCE de la semaine **44 kg MS /ha /jour**

41 VL. 21,8 litres, concentrés : **178 g / l**.

Hauteur d'herbe moyenne **9,4 cm**. L'herbe pâturée représente **15,4 kg** de MS/VL/jour.






Après la fauche précoce, 39 ares par vache sont désormais disponibles. Avec 2,5 VL par ha et une ingestion de 15,4 kg de MS par vache, l'ingestion au pâturage correspond à la pousse.

Jean-Luc BERTHOIN, Vercors Drôme

CROISSANCE de la semaine **96 kg MS /ha /jour**.

18 litres/ VL . L'herbe pâturée représente **13,8 kg** de MS/VL/jour.

Surface uniquement pâturée VL représentent 25 ares / VL, un stock d'herbe disponible de **242 kg MS / VL** et **18 jours** d'avance. Une partie de ce stock est difficilement valorisable du fait de l'excès d'eau. **Les surfaces retirées pour la fauche** sont de **9 ares/VL**, ce stock d'herbe est de **194** ce qui correspond à **14 jours** d'avance supplémentaires. Jean-Luc qui les a retirer du pâturage en mai va sans doute faire pâturer l'une des parcelles si le temps reste à la pluie. Les autres devraient être enrubannées.





SUIVIS LUZERNE LA PLUIE EMPECHE LES RECOLTES EN SEC

Repousses 2018 à la Côte st André

Luzerne en plaine , les pluies orageuses contrarient les foins

Les luzernes suivies sont en train de fleurir, **la valeur du fourrage baisse, en protéines (bientôt moins de 200 en MAT) et en énergie**. Les orages fréquents ne permettent pas de faire du foin, les éleveurs caprins vont subir double peine : baisse de la valeur alimentaire de la 1ere coupe, et perte d'une coupe sur l'année. Si un petit creneau se presente en fin de semaine, certains auront intérêt à vendre l'herbe sur pied pour un éleveur bovins qui enrubannerait.

Dans le Trièves, malgré la forte production, la luzerne a conservé une valeur intéressante le 22 mai (234 MAT et 0,82 UFL)

	date	hauteur cm	rendement		MAT	UFL	PDIN	PDIE
			T MB	T MS				
Trièves Prébois 1° coupe Récolté 24 mai Autochargeuse	12/04/18	10						
	26/04/18	34	11,2	1,8	264	0,87	159	74
	03/05/18	45	14,2	2,2	256	0,91	156	74
	15/05/18	75	20,0	3,3	235	0,80	145	75
	22/05/18	85	23,8	4,8	234	0,82	142	70
Drôme Caprins, foin BR St paul les Romans	18/04/18	50	21,8	3,4	283	0,91	174	78
	07/05/18				224	0,70	136	63
	24/05/18				205	0,71	123	61

1° coupe fauchée tôt, seconde coupe de qualité et en quantité

Les éleveurs qui ont pu ensilé tôt (avril en Isère) ou réussi du foin (fin avril près de Valence), ont des luzernes de qualité, proches des 300 de MAT.

Les conditions très difficiles du printemps 2018 réalimente le débat des coupes précoces en système caprin Picodon : séchage en grange ? Affouragement en vert ? Vente sur pied à des éleveurs bovins ?

2° coupe, repousses de luzerne après ensilage précoce en 1°

St Chef, nord Isère 2° ensilage le 31 mai	25/05/18	29	7,5	1,1	329	0,88	205	81
	30/05/18	44	10,5					
La côte st André	24/05/18	32	9,6	1,4	303	0,93	187	79
Alixan, plaine de valence	25/05/18				285	0,91	174	75

Nord Isère
Gaec de la Goule
luzerne Bio
2eme coupe le 31 mai 2018

