



### Soleil, chaleur et vent : les récoltes ont été très rapides en juin

Même en montagne, les dernières parcelles fauchées ne sont pas si tardives. Malgré les 3 semaines sans pluies et la forte évapotranspiration, les prairies pâturées suivies dans les 5 exploitations restent poussantes fin juin.

### Plaine 2018, début juillet,

La pousse subit le manque d'eau : **45 kg de MS/ha/jour** en moyenne sur les 2 exploitations mesurées cette semaine.

**Au pâturage**, si vos prairies sont à dominantes graminées, pour favoriser la constitution de stocks sur pied, faire un **épandage d'azote** : lisier ou purin pour les Bio, 30 à 50 unités d'azote minérale pour les conventionnels.

**Pour les exploitations caprines Picodon qui ont besoin de reconstituer des stocks de foin**, penser au **semis de dérobées estivales** après les récoltes de céréales : privilégiez les mélanges à base de Moha et Trèfle Alexandrie. Semer le plus rapidement possible après la moisson.

### En montagne,

la pousse de cette semaine est de **35 kg de MS/ha/jour en moyenne sur Vercors et Chartreuse**. Ceux qui ont pu récupérer des surfaces fauchées tôt se rapprochent des 40 ares par VL début juillet et, avec un pâturage jour et nuit, les vaches maximisent l'ingestion d'herbe pâturée.

Si du fait des fortes pluies, vous n'avez pas pu faucher et que vous manquez de parcelles pâturables, vous pouvez offrir aux animaux des parcelles qui avaient été retirées de la pâture en mai : les graminées à feuilles fines de montagne gardent une valeur intéressante même en juin.

Si vous avez beaucoup de graminées précoces dans ces fauches à pâturer, vous pouvez aussi faire du topping en fauchant avant de faire pâturer l'herbe partiellement desséchée, encore en andain.

Tableau 1 :  
Température et précipitations  
sur Drôme Isère en 2018

Altitude	23 stations Drôme-Isère	Cumul le 1° juillet 2018	
		températures	pluviométrie
		°C depuis 1° février	mm depuis 1° janvier
158	ROMANS sur Isère	2021	564
220	GRENOBLE le Versoud	2004	564
175	DIVAJEU	2003	550
163	VALENCE-CHABEUIL	1996	500
153	ALBON	1970	412
295	Vienne REVENTIN	1950	385
308	ST-JEAN en Royans	1882	560
272	CHATTE	1864	501
358	BOURGOIN	1856	419
545	ST ROMAN en Diois	1818	655
400	ST-CHRISTOPHE Le Laris	1803	593
416	BOURDEAUX	1771	626
384	ST Etienne de st GEOIRS	1720	441
446	ST AUPRE	1706	760
625	ST-AUBAN sur Ouveze	1643	603
820	COMBOVIN	1457	711
824	SEDERON	1420	684
879	La CHAPELLE en Vercors	1337	658
885	LA MURE	1360	584
1059	LUS la CROIX Haute	1329	738
950	ST-PIERRE-LES EGAUX	1317	946
1027	VILLARD DE LANS	1214	633
1564	ST CHRISTOPHE EN OISANS	1063	505



### Gaëc de SULLY, Chambarrans, CROISSANCE de

la semaine **60 kg MS /ha /jour**. Début juin, pousse élevée par rapport à la moyenne sur 5 ans. L'herbe est restée verte malgré la chaleur et l'absence de pluies.

L'herbe pâturée représente **8,7 kg de MS/VL/jour**.

Les refus ont été fauchés ou enrubannés sur l'ensemble des parcelles. La parcelle semée au printemps avec un multi-Luzerne (St Marcellin + 5,5 kg de luzerne) a été pâturée en juin.

### Earl de PLAMBOIS à St Didier de la tour,

CROISSANCE de la semaine **30 kg MS /ha /jour**

Sur la journée, les vaches consomment **12,3 kg MS d'herbe**.

Hauteur moyenne 7,1 cm. Production de la semaine : **22,5**

l/VL/ j et **69 g /l** de concentrés

2 parcelles ont été exploitées en topping. Une mélangeuse est distribuée tous les 2 jours. 25 ares par vache sont disponibles.

L. A. du Valentin à Bourg les Valence,

Pas de mesures cette semaine. Le pâturage tournant petites parcelles s'est bien passé en juin.

L'irrigation des maïs a débuté la dernière semaine de juin. Le méteil grain a été récolté, broyé et stocké en boudin.

### Guillaume Vessard, Chartreuse

CROISSANCE de la semaine **39 kg MS /ha /jour**.

Hauteur d'herbe moyenne 8,7 cm. Après les fauches, 40 ares par vache sont désormais pâturés. L'ingestion de **15,3 kg de MS** par vache.

La production est de 22,9 litres / VL et la

complémentation 182 g/litre.

### Jean-Luc BERTHOIN, Vercors Drôme

CROISSANCE de la semaine **33 kg MS /ha /jour**.

16,7 litres/ VL . L'herbe pâturée représente **13 kg de MS/VL/jour**.

Jean-Luc fait pâturer une des parcelles fauchées et une parcelle jusqu'ici pâturées par les génisses. **41 ares / VL** sont désormais disponibles mi-juin.

