




BULLETIN pâtur'RA n° 5

Drôme Isère

Chambre d'Agriculture et Conseil Elevage

20/03/18 Page 1



Mise à l'herbe, repère 300° depuis le 1° février

Pour les pâtures précoces, l'INRA de Toulouse, conseille de démarrer le pâturage lorsque l'on atteint les 300° en cumul depuis le 1° février.

En 2018, en plaine, ce seuil est quasiment atteint au 18 mars (tableau 1).

Tableau 1 : température et précipitations sur Drôme Isère en 2018

Altitude	23 stations Drôme-Isère	Cumul 2018	
		températures	pluviométrie
		°C depuis 1° fev	mm depuis 1° jan
153	ALBON	281	180
158	ROMANS sur Isère	291	206
163	VALENCE-CHABEUIL	293	185
175	DIVAJEU	295	220
295	Vienne REVENTIN	255	191
272	CHATTE	246	213
308	ST-JEAN en Royans	249	250
358	BOURGOIN	230	215
400	ST-CHRISTOPHE Le Laris	220	236
416	BOURDEAUX	227	283
545	ST ROMAN en Diois	222	294
625	ST-AUBAN sur Ouveze	200	304
220	GRENOBLE le Versoud	252	282
384	ST Etienne de st GEOIRS	201	228
446	ST AUPRE	182	386
820	COMBOVIN	143	276
824	SEDERON	129	309
879	La CHAPELLE en Vercors	112	320
885	LA MURE	113	297
950	ST-PIERRE-LES EGAUX	95	512
1027	VILLARD DE LANS	82	317
1059	LUS la CROIX Haute	94	355
1564	ST CHRISTOPHE EN OISANS	48	305

Mars 2018, le froid persiste

Les températures font le yoyo depuis 3 semaines : alternance de douceur et de gel. Sur les 3 dernières semaines, le nombre de jours de gel reste élevé même en plaine (tableau 2).

Tableau 2 : nombre de jours de gel en 2018

Altitude	territoire	cumul du 26 février au 18 mars
189	Plaine vallée du rhône	7
383	Piemont 26 Bourgoin Chatte	8
350	grenoble Voironnais	9
841	Montagne 26 Vercors et sud Drôme	12
980	Montagne 38 Chartreuse Vercors Mathesyne et Lus	13
1564	haute montagne	18

Excédent d'automne hiver et feuilles gelées, à enlever dès maintenant.

A la mise à l'herbe, les animaux trient moins : commencer par pâturer vos parcelles où l'on voit beaucoup de feuilles sénescentes (Dactyle, Fétuque), voir les parcelles de RGI ou RGH très touchées par le gel, si elles sont portantes. Ce déprimage-nettoyage permettra aux prairies encore rase de démarrer leur pousse. Ce déprimage peut aussi être réalisé par des génisses.





Gaec de SULLY à Varacieux, Chambarrans, 420 m d'altitude

Pâturage tournant sur 19 parcelles, 30 ares par vache, temps présence de 2 à 3 jours.

Fin de semaine dernière, les parcelles avaient de grandes différences de hauteur : de **3,2** à **7,1** de hauteur (4,7 cm de moyenne)



Earl de PLAMBOIS à St Didier de la tour, 410 m d'altitude

Les vaches sortent l'après-midi depuis le 6 mars. Elles disposent de 10,50 ha soit 26 ares par vache. Le pâturage est découpé en 5 parcelles, avec utilisation d'un fil avant Passage de la herse émousseuse après le premier passage des vaches.

Lycée Agricole du Valentin à Bourg les Valence, 150 m d'altitude

Les vaches pâturent depuis le 11 mars. Sur ce premier cycle elles disposent de 2 parcelles par jour. Le 20 mars, elles sont déjà passées sur 15 des petites parcelles soit près de la moitié de la surface pâturée. Le pâturage est uniquement de jour. Les vaches se gèrent elles mêmes , entre bâtiment et parcelle pâturée, elles se déplacent comme elles veulent.

Les parcelles pâturées sont à **4,7** cm de moyenne. Les parcelles qu'elles vont pâturer dans les 10 jours à venir sont à **6,7** cm. Le pâturage représente désormais presque **un 1/3 de la ration** en fourrage.





BULLETIN pâtur'RA

Drôme Isère

Chambre d'Agriculture et Conseil Elevage

20/03/18 Page 3

SUIVIS RGI et LUZERNE POUR RECOLTER AU BON STADE

SUIVIS RGI

A St Chef, avec des températures de **-12°C**,
les feuilles de RGI ont **gelé** sur 5 cm
La teneur en **MAT est faible**



hauteur	épis	Rendement	MS	MAT	UFL	PDIN	PDIE	PDIA	Cellulose
45 cm	5 cm	2,84 t MS	23,3%	131	1,04	84 g.	94 g.	29 g.	149 g.

Une visite de vos parcelles de RGI s'impose

Suite au gel de mars, les dégâts sont fonction de l'importance des températures négatives et du stade de développement de vos RGI :

- soit la plante a uniquement l'extrémité des feuilles gelée, dans ce cas le RGI va continuer son développement.
- soit la plante a gelé et les nouvelles tiges repartent de la base du plateau de tallage, dans ce cas avec une hauteur d'herbe au-dessus de 30 cm, **il est conseillé de faucher au plus vite**, l'herbe sera de qualité moyenne destinée aux génisses, mais cela permettra une bonne deuxième coupe.

Souvent, dans la parcelle, les deux phénomènes sont observés, la décision sera fonction de la proportion d'herbe sèche.

Extrémité
des feuilles
Gelée



plante gelée

SUIVIS LUZERNE

Les luzernes attendent la chaleur,
Elles n'ont pas encore démarré la pousse.

Photo de luzerne de La Cote St André GAEC Ferme de la Revillière
semée à l'automne 2016

En février 2018 épandage de 200Kg de 0-0-40
Début mars épandage de 1,5T de chaux par Ha

