

Observer pour mieux pâturer en Isère

Note Patu'RA n°10 – lundi 21 mai 2012

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Pousse de l'herbe :

Le climat de la semaine dernière a permis une bonne reprise de la pousse de l'herbe sur l'ensemble des sites suivis. Les résultats sont hétérogènes et ceci est principalement lié à la hauteur d'herbe moyennes des parcelles. Plus l'herbe est haute (supérieure à 15 cm), plus la pousse de l'herbe s'intensifie.

Chantier de récolte : Tout reste à faire !!!!,

En plaine, les chantiers de foin sont à prévoir rapidement : les 1000°C de somme de températures sont atteints et de nombreuses parcelles commencent à verser d'où la récessivité de récolter tôt pour privilégier la qualité.



Luzerne/trèfle violet : à faucher rapidement malgré le stade des plantes peu avancés.

En montagne : les chantiers d'enrubannage sont à prévoir dès le retour du beau temps (fin de semaine).

Fauche des refus : la fauche de refus permet une meilleure reprise de la pousse de l'herbe.

Apport d'azote : Poursuivre les apports d'azote sur les parcelles fraîchement fauchées ou pâturées.

Céréales immatures : Les protéagineux (pois et vesce) en fleurs dépassent de 20 à 30 cm les céréales. Le risque de verse est potentiel cette année.



Contact Isère : Michael Bonnault – Isère Elevage – tel : 06.30.63.23.40

