

Observer pour mieux pâturer en Isère

Note Patu'RA n°8 – lundi 7 mai 2012

Un réseau régional pour faciliter vos décisions



La reprise de la pousse de l'herbe se confirme de nouveau cette semaine. Sur l'ensemble des sites suivies, nous notons une croissance supérieure à plus de 110 kg MS/ j/ha. Soit des besoins journaliers de 6 VL sans complémentation à l'auge.

Cette croissance à caractère exponentiel s'observe surtout sur les parcelles dont la hauteur moyenne atteint les 15 à 20 cm (plus la hauteur d'herbe est élevée et plus la croissance augmente).

Ce pic de croissance arrive au moment de l'épiaison des graminées les plus précoces (pâturin, ray grass mais aussi dactyle, fétuque...). Il paraît indispensable de ne plus faire pâturer les vaches sur les parcelles trop développées mais de les réserver pour la fauche.

L'humidité du sol et la douceur attendue devraient favoriser des repousses de qualité.

Ensilage : la météo pénalise le bon ressuyage des ensilages. Pour faciliter l'acidification d'un ensilage en cas de condition de récolte limite les conservateurs de type acide sont à privilégier sur ce type d'ensilage (MS inférieure à 25%).



Contact Isère : Michael Bonnault – Isère Elevage – tel : 06.30.63.23.40

