



Observer pour des fourrages de qualité

Note Patur'RA

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°10- semaine 20 - Lundi 11 mai 2015

La Chapelle de Mardore 650M

Cumul température 01/02 : 643°C
Croissance moyenne : 102 kg/j/ha (85kg sur 15j)
27 kg/vache traite (0,8kg de céréales)

Villechenève-670M exposé sud

Cumul température 01/02 : 758°C
Croissance moyenne : 62 kg/j/ha (66 kg sur 15j)

Résultat Rhône source spel69

Avril 2013 23.7kg/vl à 39.9 tb et 32.3 tp
Avril 2014 24.6kg/vl à 38.9 tb et 32.9 tp
Avril 2015 24.9kg/vl à 38.9 tb et 32.6 tp

Bibost- 400 M

Cumul température 01/02 : 853°C
Croissance moyenne : 72 kg/j/ha (75kg sur 15j)
26 kg/vache traite (2 kg de céréales et 0,8 kg de vl)
Pâturage de nuit

Ste catherine 750 M exposé nord

Cumul température 01/02 : 702°C
Croissance moyenne : 50 kg/j/ha (47 kg sur 15j)
4 kg de foin à l'auge
21 kg/vache traite (2 kg de concentrés)

St chamond (42) -400 M

Cumul température 01/02 : 820°C
Croissance moyenne : 50 kg/ha/j (70kg sur 15j)

Le mois d'avril 2015 plutôt sec a permis une mise à l'herbe dans d'excellentes conditions. Le niveau de production moyen approche les 25kg/j/vl en moyenne sur le département.

La croissance était toujours au rendez-vous la semaine dernière avec en moyenne 70kg/j/ha sur le département. La chaleur de ce début de semaine va favoriser la montée des épis dans les tiges.

Sur les parcelles à dominante graminées, s'ils n'ont pas été coupés au tour précédent, les épis vont ou sont apparus. Sur ces dernières, le rapport tiges/feuilles va se dégrader en faveur des tiges. La valeur alimentaire va donc diminuer. Il convient de rééquilibrer la ration dès aujourd'hui si vous constatez ce phénomène. Entre la perte d'ingestion et la baisse de valeur alimentaire, le niveau de la ration de base diminue d'environ 4l de lait en ration tout herbe. N'hésitez pas à remonter les quantités de concentré pour palier à cette baisse. L'introduction dans la rotation des parcelles ensilées précocement permettra aussi de maintenir le niveau de production. Malgré cela, et même avec l'augmentation des quantités de concentré, la ration à la pâture reste la moins coûteuse. Même avec 5 kg de concentrés qui équilibrent la ration à 27 l environ le coût est d'environ 1.5 euro/vache/jour en ration tout herbe. En ration hivernale pour un même niveau de production, il approchera 3 euros/vache/jour.

Sur les parcelles à dominante légumineuse, la chute de valeur avec l'avancée du stade est moins importante. L'impact sur le niveau de production sera donc moins fort si le taux de légumineuse dans les parcelles pâturées est conséquent.

La dynamique de croissance est encore positive, la fauche des refus si elle se fait rapidement relancera une repousse feuillue, nutritive et appétante pour les animaux. La hauteur d'intervention doit être suffisante pour permettre un redémarrage rapide. On visera 8-10 cm.

Le plus difficile dans les semaines à venir sera d'être suffisamment réactif pour palier à la baisse de croissance. Deux options vont s'offrir à nous, dans la mesure du possible, agrandir la surface à pâturer ou augmenter la quantité distribuée à l'auge.

Contact

Mickaël COQUARD

Port : 06 89 12 55 72

Mail : mickaelcoquard@cmre.fr

Note technique hebdomadaire - IPNS

SPEL - 18 Avenue des Monts d'Or

69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Maison de l'élevage



	Cumul de température	Remarque
Fin premier tour de pâturage	600°C	
Fauches précoces (ensilage, enrubannage, séchage en gge)	700-800 °C	C'est aussi la quantité d'herbe disponible qui peut décider à faucher...
Foin précoce (recherche de qualité)	950-1000°C	
Foin tardif	1100-1200°C	

