



# Observer pour mieux pâturer

## Note Patur'RA

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°3 – semaine 13 – lundi 23 mars 2015

### La Chapelle de Mardore 650M

Cumul température 01/02 : 177°C  
Vaches lâchées 3 h les après midi

### Villechenève-670M

Cumul température 01/02 : 217°C  
4,4 cm d'herbe dans les parcelles

Avec le retour du printemps, vous allez retrouver vos bulletins patu'ra hebdomadaire.

Les objectifs de ces notes sont multiples :


- Vous informez sur la dynamique de croissance de l'herbe et ainsi faire coïncider la pousse aux besoins de vos animaux
- Vous apportez des éléments de décision pour optimiser votre pâturage
- Vous fournir des données techniques sur la gestion de l'herbe

Ces bulletins doivent aussi vous incitez à faire le tour de vos parcelles. Les résultats de nos mesures et les conseils proposés sont bien sûr à adapter à votre situation.

**Plaines et coteaux (< à 500m) :** le stade des 250°C a été atteint. Si elle n'a pas eu lieu la mise à l'herbe doit se réaliser. Une mise à l'herbe réussie facilite la gestion du pâturage sur les semaines à venir. Les parcelles de foin peuvent encore être déprimées pour agrandir la surface pâturée.

Pour les génisses, la date de mise à l'herbe n'est pas urgente sauf si vous disposez habituellement d'excès d'herbe dans les parcs qui leurs sont destinées

**Monts du lyonnais et du beaujolais (> à 500m) :** Les cumuls température atteignent cette semaine les 200°C. Il est encore temps de prévoir sa saison de pâturage. La surface, le nombre de parcelles, le sens de rotation ainsi que le chargement et la complémentation ou non à l'auge sont autant de facteurs à étudier pour faire coïncider la croissance de l'herbe aux besoins des animaux. Si les conditions de portances restent suffisantes, les premières mises à l'herbe pourront avoir lieu cette fin de semaine. Le temps de présence au pâturage est le seul moyen efficace pour limiter la part pâturée. Au pâturage la vitesse d'ingestion est d'environ 2 kg de matière sèche par heure. Pour les parcelles de fauche précoce, le deuxième apport d'azote doit se faire dans la semaine.



### Bibost- 400 M

Cumul température 01/02 : 262°C  
Croissance moyenne : 40 kg/j/ha  
Vaches lâchées 3h les après midi


### St Martin en Haut 750 M

Cumul température 01/02 : 190°C


### St chamond (42) -400 M

Cumul température 01/02 : 270°C  
Croissance moyenne : 19 kg/ha/j

évolution des cumuls température base 01/02( 0-18°C)



croissance en fonction de la hauteur d'herbe à la mise à l'herbe



## Contact

Mickaël COQUARD

Port : 06 89 12 55 72

Mail : mickaelcoquard@cmre.fr

Note technique hebdomadaire - IPNS

SPEL - 18 Avenue des Monts d'Or

69890 LA TOUR DE SALVAGNY

