



# Observer pour mieux pâturer

## Note Patur'RA

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°5 – semaine 15 – Mardi 07 avril 2015

### La Chapelle de Mardore 650M

Cumul température 01/02 : 260°C  
6,1 cm d'herbe dans les parcelles  
Croissance moyenne : 61 kg/j/ha (48kg sur 15j)

### Villechenève-670M exposé sud

Cumul température 01/02 : 330°C  
7.3 cm d'herbe dans les parcelles  
Mise à l'herbe le 05/04  
Croissance moyenne : 79 kg/j/ha (63 kg sur 15j)

### Bibost- 400 M

Cumul température 01/02 : 390°C  
Croissance moyenne : 51 kg/j/ha (45kg sur 15j)  
22 kg/vache traites (6,5 mois moyen de contrôle)  
25 kg de maïs à l'auge

### Ste catherine 750 M exposée nord

Cumul température 01/02 : 276°C  
4.5 cm d'herbe dans les parcelles

### St chamond (42) -400 M

Cumul température 01/02 : 400°C  
Croissance moyenne : 30 kg/ha/j (43kg sur 15j)

Le temps frais marqué par le vent du nord freine la croissance de l'herbe, notamment sur les parcelles exposées nord. Attention tout de même, l'hétérogénéité entre parcelles et exploitations peut être importante.

Température, état hydrique du sol, rayonnement, nutrition minérale, développement foliaire sont autant de facteurs qui influent sur la croissance des prairies. La température reste un des facteurs les plus importants. C'est pour cela qu'en année tardive ou plus généralement en montagne la pousse est plus explosive. Avec 10 j de retard sur une année moyenne, 2015 risque d'être marqué par ce phénomène. Pour anticiper et profiter au mieux de cette ressource de qualité et bon marché il convient d'être à jour dans notre pâturage. Pour ce rendre réellement compte de la quantité d'herbe dans vos parcelles rien ne remplace le tour de pâturage.

**Plaines et coteaux (< à 500m) :** la croissance a démarrée sur l'ensemble des exploitations. Les rations de transition sont d'actualités. La quantité d'herbe sur pied détermine la quantité de fourrage à laisser à l'auge. En pâturage tournant sur la période de plein printemps, il faut viser 11-12 cm d'herbe à l'entrée de parcelle et 5-6 cm à la sortie des animaux. Sur les parcelles les plus chaudes destinées pour le foin, les animaux doivent en être sortis. Sinon on risque d'étêter les graminées et donc perdre en rendement.

Le stade des ray grass avance. Surveillez les parcelles les plus précoces pour déterminer votre date de récolte.

**Monts du lyonnais et du beaujolais (> à 500m) :** la croissance est très hétérogène, les 300°C approchent doucement. Le beau temps annoncé cette semaine doit lancer la mise à l'herbe sur la plupart des exploitations si elle n'a pas eu lieu. Un premier tour rapide si la hauteur d'herbe est inférieure à 7-8 cm facilite la gestion du pâturage. Si la hauteur d'herbe est déjà supérieure il faut dès à présent rentrer dans un rythme de pâturage classique et réduire la ration à l'auge. Le temps de présence au pâturage déterminera les quantités d'herbes ingérées.

## Contact

**Mickaël COQUARD**

Port : 06 89 12 55 72

Mail : [mickaelcoquard@cmre.fr](mailto:mickaelcoquard@cmre.fr)

Note technique hebdomadaire - IPNS


SPEL - 18 Avenue des Monts d'Or

69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Maison de l'élevage  
DU RHÔNE



évolution des cumuls température base 01/02 (0-18°C)



Mise à l'herbe

