



La Chapelle de Mardore 650M


Cumul température 01/02 : 610°C
Croissance hebdomadaire : 26 kg (26kg sur 15j)
22.6kg/vl 20g de concentré/l

Pomeys-650 M

Cumul température 01/02 : 709°C
Croissance hebdomadaire : 50 kg (42kg sur 15j)
25.3kg/vl 100g de concentré/l

Grammond-800 M

Cumul température 01/02 : 649°C



Bibost- 400 M

Cumul température 01/02 : 769°C
Croissance hebdomadaire : 45kg(38kgsur 15j)
21.5 kg/vl 110g de concentré/l

Coise 650 M

Cumul température 01/02 : 709°C
Croissance hebdomadaire : 58kg(48kg sur 15j)
30% d'herbe pâturée dans la ration

St jean de touslas -250 M

Cumul température 01/02 : 845°C
Croissance hebdomadaire : 61kg (40kg sur 15j)
28kg/vl 160g de concentré/l


Entre 40 et 60 mm sont tombés sur le département la semaine dernière. Cette pluie salvatrice va permettre le démarrage de la pleine pousse.

Malgré des températures faibles, la croissance a fait un bon cette semaine avec l'arrivée de la pluie. Elle est en moyenne de 48kg cette semaine et approchera certainement les 65-70kg la semaine prochaine. Avec une croissance moyenne autour de 60kg de MS/j/ha, les parcelles d'où les animaux viennent de sortir poussent à moins de 30kg, alors que sur les paddocks ou le temps de repos approche les 15-18j, la croissance peut atteindre 90-110kg/j/ha. Avec ce niveau de croissance, la prairie gagne près de 0,5cm/j soit près de 4cm/semaine. S'ils n'ont pas été consommés au dernier passage, la montée des épis dans les gaines risque d'être rapide. Le tour de parcellaire au minimum une fois par semaine est donc impératif pour juger du volume d'herbe et du stade des graminées précoces. C'est la hauteur d'entrée dans les parcelles qui déterminera le niveau de complémentation à l'auge ou le débrayage de parcelle pour la fauche. Lorsque cette dernière atteint 10-12cm herbomètre (environ 20 cm feuilles tendues) sur plus de 5j consécutifs, il faut réfléchir à retirer des parcelles du tour.

Ensilage d'herbe :

La sécheresse de printemps a ralenti le métabolisme des graminées. La pluie de la semaine dernière risque de récupérer le retard et l'épiaison des espèces précoces sera rapide. Malgré une météo incertaine, les récoltes vont démarrer. Les essais top ensilages réalisés ces dernières années ont permis d'atteindre 28% de MS en 24h. Jusqu'à 30-35% de MS, seule une exposition maximale à la lumière permet de gagner rapidement les points de MS tant espérés. Avec une fauche à la conditionneuse en laissant les andains étroits en place, seul le dessus de l'andain est exposé à la lumière. L'intérieur de l'andain quel que soit la météo, restera à un taux de MS proche de l'herbe sur pied. Privilégiez donc une fauche à plat et une reprise du fourrage juste devant l'ensileuse pour maximiser le taux de matière sèche. L'augmentation du risque d'introduction de terre dans le fourrage sera limitée par une bonne maîtrise de la hauteur de fauche (autour de 7-8cm).

Courbe de croissance de l'herbe d'après a voisin



Moyenne expérimentation top ensilage 2017-2019

Fourrage	À plat	En andain
j0	15%	15%
j+24h	28%	22%
j+48h	37%	28%