



Observer pour des fourrages de qualité

ELEVEUR DE FOURRAGE

Note Patur'RA

Note N°13- semaine 20 - Lundi 15 mai 2017

La Chapelle de Mardore 650M

Cumul température 01/02 : 744°C
Croissance : 25kg MS/j/ha (37 kg sur 15j)
Pâturage des parcelles d'ensilage

Villechenève-670M

Cumul température 01/02 : 910°C
Croissance : 35 kg MS/j/ha (40kg sur 15j)

Grezieu le marché-700 M


Cumul température 01/02 : 816°C
Croissance : 42 kg MS/j/ha (41kg sur 15j)
Complémentation en enrubbage

Bibost-400 M

Cumul température 01/02 : 1005°C
Croissance : 24kg MS/ha/j (33 sur 15j)
Complémentation en enrubbage la nuit

Longes-400 M

Cumul température 01/02 : 1050°C
Croissance : 30 kg MS/j/ha (30kg sur 15j)



Après avoir souffert du sec en avril les prairies sont maintenant pénalisées par une humidité excessive.


La croissance est en moyenne de 31kg/j/ha cette semaine. Les matinées fraîches ont encore freiné la croissance. Le retour de la pousse se fait attendre. Avec entre 90 et 130 mm de pluie tombée depuis le 25/04 sur le département, la portance est limitée. Privilégier une sortie des animaux sur les parcelles les plus saines avec des temps de présence à la pâture limités (par exemple en les sortant un peu plus tard qu'à l'accoutumé). Veillez aussi à laisser à la stabulation les animaux en chaleur. Cette croissance modérée permet tout de même de nourrir 4 vl/ha avec une demi ration à l'intérieur. Si le stock d'herbe sur pied n'est pas encore reconstitué, la complémentation à l'auge doit être renforcé.

Avec une part pâturée moins importante la substitution fourrage concentré devient moins forte. La complémentation en concentré est alors plus intéressante. Pour estimer si les animaux ont suffisamment ingéré de fourrage, la note de remplissage de rumen est un bon indicateur. Cette note dépend du stade physiologique de l'animal mais aussi de la qualité et de la quantité de fourrage ingéré. 30 jours après vêlage, la vache doit déjà retrouver une capacité d'ingestion forte. Une note de 3 traduit ce dynamisme. Si la majorité des animaux ont une note supérieure à 4, le fourrage peut être trop encombrant. A l'inverse des notes régulièrement inférieures à 3 peuvent être signe de problèmes métaboliques ou de sous-alimentation en fourrage. Surveillez donc les rumens pour ajuster les quantités de fourrages distribuées à l'auge


Récolte des méteils :

Pour équilibrer les systèmes fourragers, l'introduction dans la rotation de méteils fourrager peut paraître intéressant. Selon la stratégie de distribution (génisses ou vaches laitières) le stade de récolte sera différent. Si l'objectif est de remplacer le RGI dans la ration des vaches laitières, on optera pour une récolte précoce (autour de 700-800°) et une part de protéagineux (pois vesce fêverole) importante (>60%). Pour un produit destiné à des animaux à plus faible besoins, c'est la céréale qui sera majoritaire. On visera une récolte plus tardive avec un maximum de rendement. Des essais sont en cours sur le département parlez en a votre conseiller.

CE QU'IL FAUT VISER POUR LE REMPLISSAGE DU RUMEN



croissance de l'herbe dans le Rhône



Contact

Mickaël COQUARD

Port : 06 89 12 55 72

Mail : mickaëlcoquard@cmre.fr

Note technique hebdomadaire - IPNS

SPEL - 18 Avenue des Monts d'Or

69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Maison de l'élevage

