Observer pour des fourrages de qualité
ELEVEUR DE FOURRAGE

Note N°14– semaine 22 – Lundi 25 mai 2020

La Chapelle de Mardore 650M
Cumul température 01/02 :1020°c
Croissance hebdomadaire : 25kg/j/ha(23kg sur 15j)

Meys-600 M
Cumul température 01/02 :1180°c
Croissance hebdomadaire : 33kg/j/ha(39kg sur 15j)



Bibost- 400 M
Cumul température 01/02 : 1265° c
Croissance hebdomadaire : 25kg (35kg sur 15j)
Réalisations des foins

Larajasse 700 M
Cumul température 01/02 :1098°c
Croissance hebdomadaire :41kg (43 kg sur 15j)

St jean de touslas –250 M
Cumul température 01/02 :1320°c
Croissance hebdomadaire : 21kg/j/ha (33kg sur 15j)

Retrouvez nos vidéos en ligne pour vous accompagner sur la gestion du pâturage
https://www.facebook.com/Service-Promotion-de-LElevage-Laitier-418403301919939/
http://www.fidocl.fr/etiquettes/rhone

Le vent du nord freine encore la croissance, malgré tout, la production sur début mai a été bonne. Il faudra maintenant agrandir la surface pâturée ou augmenter l'accompagnement à l'auge.

Le coût alimentaire de l'herbe pâturée, n'a pas d'égal, il varie suivant les situations entre 30 et 50 euros/t de MS. La bonne gestion sur le plein printemps permet d'améliorer son coût de production mais pour les systèmes les plus efficients, la véritable différence se fait sur la capacité a prolonger la saison de pâture. La météo est primordiale dans la dynamique de croissance de l'herbe, mais il faut garder à l'esprit que les pratiques jouent énormément. Une fois l'épiaison dépassée, la perte de valeur nutritive est très faible. Pour les espèces non remontantes, une baisse de valeur nutritive significative intervient seulement lorsque la première feuille entre en senescence (feuille marron jaune) soit au-delà d'un cumul de 500°j. Il faut alors tout mettre en œuvre pour maximiser la croissance de l'herbe. Deux leviers sont primordiaux pour optimiser cette croissance. Le premier est l'allongement du temps de repos, qui doit passer d'une vingtaine de jours à 28-35j. Concrètement, l'allongement du temp de repos se fera en agrandissant la surface pâturée par l'introduction de parcelle de fauche. Si on ne dispose pas de parcelle à réintroduire, il accompagner à l'auge, refermer les animaux la nuit et par exemple transformer une parcelle de 24h en deux parcelles de 12h distribuées sur 48h. On pourra ainsi doubler le temps de repos. Dans un deuxième temps on veillera à faire pâturer un peu moins ras pour accélérer la reprise de croissance. Pour cela, il est impératif d'entrer dans des parcelles disposant de suffisamment d'herbe. Ces préconisations sont valables uniquement sur des espèces non remontantes.





Remplissage de rumen : Avec le retour de forte chaleur et une herbe moins appétante, les animaux ont tendance à se regrouper notamment les après-midis. Pour estimer si les animaux ingèrent suffisamment de fourrage, la note de remplissage de rumen est un bon indicateur. Cette note dépend du stade physiologique de l'animal mais aussi de la qualité et de la quantité de fourrage ingéré. 30 jours après vêlage, la vache doit déjà retrouver une capacité d'ingestion forte. Une note de 3 traduit ce dynamisme. Des notes régulièrement inférieures à 3 peuvent être signe de problèmes métaboliques ou de sous-alimentation en fourrage. Les horaires de distribution des fourrages ou la gestion d'ouverture du nouveau paddock sont des leviers pour maintenir les niveaux d'ingestion.

Rédaction :
Mickael COQUARD
06 89 12 55 72
mickaelcoquard@cmre.fr

Rédaction:
Aline VILLOT
06 34 68 10 34
aline.villot@rhone.chambagri.fr

Note technique hebdomadaire – IPNS RTE– 18 Avenue des Monts d'Or
69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»