Observer pour des fourrages de qualité
ELEVEUR DE FOURRAGE

Note N°21– semaine 29 – Lundi 15 juillet 2019

La Chapelle de Mardore 650M
Cumul temp maïs 01/05 (6-30°c) :690°c
Croissance hebdomadaire : 16 kg (13kg sur 15j)
Récolte des orges

Pomeys-650 M
Cumul temp maïs 01/05 (6-30°c) :780°c

Grammond-800 M
Cumul temp maïs 01/05 (6-30°c) :725°c



Bibost- 400 M
Cumul temp 01/05 (6-30°c) : 840°c
Croissance hebdomadaire : 10kg (10 kg sur 15j)
Récolte des méteils grains

Coise 650 M
Cumul temp maïs 01/05 (6-30°c) :780°c

St jean de touslas –250 M
Cumul temp maïs 01/05 (6-30°c) :920°c
Croissance hebdomadaire : 3kg (7kg sur 15j)
Début floraison des maïs

Malgré un retour de températures plus clémentes, les cultures souffrent d'un manque d'eau important amplifié par le vent. Veillez à ne pas surexploiter les prairies.

Avec ces conditions, la croissance d'herbe est très faible, il faut veiller à ne pas surpâturer et ainsi pénaliser le potentiel de redémarrage quand les conditions seront plus favorables. Le surpâturage a aussi pour effet de pénaliser les graminées aux détriments des dicotylédones et du sol nu. Les graminées possèdent leurs réserves carbonées dans le bas des tiges, elles sont ainsi plus sensibles à une exploitation « sévère ». Si vous constatez dans vos prairies un début de dégradation (présence de sol nu, de plante à rosette, disparition des graminées) il est impératif de sortir les animaux et laisser la prairie au repos. Sur du plus long terme, différentes stratégies pourront être mises en place pour améliorer et limiter cette dégradation (fumure organique, foin à égrainage, baisse du chargement etc).

Semis de prairie : avec le dérèglement climatique, la mise en place des prairies devient souvent compliquée. L'anticipation doit être la règle pour choisir la meilleure stratégie d'implantation. Le choix des espèces dépendra de la place de la prairie dans la rotation, 102de la pérennité souhaitée, du mode d'exploitation et du type de sol. Il faudra savoir être opportuniste par rapport aux conditions météos. Il n'existe plus de « recette » ou de période optimum d'implantation, il faut avant tout éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier et savoir déclencher le semis si les conditions sont là. Vous retrouvez sur le marché un choix important de mélange prairiaux prêt à l'emploi, aucun d'entre eux n'est adapté à toutes les situations. Les espèces majeures du mélange doivent impérativement répondre à vos attentes. Il est donc important de se pencher sur les étiquettes et sélectionner les mélanges les plus adaptés à vos besoins.

1.3.3 Synthèse concernant les espèces pour mélanges prairiaux de longue durée

Espèce bien adaptée
Espèce moins bien adaptée
Espèce inadaptée
9 – Rapide/fort
1 – Lent(e)/faible

Espèces :		Utilisation			Sol					Comportement au sein du mélange				Intérêts dans un mélange :
		Pâturage	Mixte	Fauche	Sain et profond	Alternance hydrique	Hydromorphe	Séchant acide	Séchant calcaire	Vitesse d'installation	Pouvoir de concurrence au printemps*	Pousse estivale	Productivité après 3 ans	
Espèces majeures	RGH **									9	9	1	1	Productivité dans la phase d'installation, limitation du salissement
	RGA précoce à ½ tardif									8	5-7	1	3	Qualité, appétence, engazonnement, vitesse d'installation, pâturage
	RGA tardif à très tardif									8	3-5	1	3	Qualité, appétence, engazonnement, vitesse d'installation, pâturage
	Dactyle	(1)								5	8	8	9	Protéines, potentiel de production estivale, pérennité
	Fétuque élevée	(1)								3	7	8	9	Potentiel de production estivale, pérennité, fibres
	Fétuque des prés									3	4	5	3-5	Qualité, appétence
	Fléole									1	3-4	4	5	Aptitude au fanage, résistance au froid
	Trèfle blanc		(1)	(1)						5	3-4	3-4	4-6	Qualité, appétence, fixation d'azote, aptitude au pâturage
	Trèfle violet **									7	6	6	1	Rapidité d'installation, énergie et protéines, fixation d'azote, appétence, production premières années
	Luzerne							(2)		4	3-6	9	7	Protéines, production notamment estivale, fibres, fixation d'azote

Rédaction :
Mickael COQUARD
06 89 12 55 72
mickaelcoquard@cmre.fr

Publication :
Laetitia CANONIER
06 25 90 33 38
laetitia.canonier@rhone.chambagri.fr

Note technique hebdomadaire – IPNS RTE– 18 Avenue des Monts d'Or
69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»