



Observer pour des fourrages de qualité ELEVEUR DE FOURRAGE

Info Maïs

Note N°24- semaine 37- Lundi 11 septembre 2017

Les sauvages 700-900 M

Journée du **07 septembre** 21 parcelles analysées
Taux de MS moyen : 31.4%
Pourcentage de maïs >28% de MS : 86%

La chapelle sur coise-500-700 M


Journée du **30 Aout** :55 parcelles analysées
Taus de MS moyen : 32.6%
Pourcentage de maïs >28% de MS :91%

St martin en haut 700-800 M

Journée du **01 sept** :49 parcelles analysées
Taus de MS moyen : 30.6%
Pourcentage de maïs >28% de MS :79%

Larajasse 700-800 M

Journée du **07 sept** :34 parcelles analysées
Taus de MS moyen : 31.5%
Pourcentage de maïs >28% de MS :85%



Dates prévisionnelles du stade 32% de matière sèche en condition normale de végétation

Précocité	Indice	Date de semis	400 mètres	5 à 600 mètres d'altitude	7 à 800 mètres d'altitude
Très précoces	<240	1er juin	A ensiler	A ensiler	16-sept
		1er mai	A ensiler	A ensiler	A ensiler
Précoces	240-280	10-mai	A ensiler	A ensiler	A ensiler
		20-mai	A ensiler	A ensiler	A ensiler
1/2 précoces	280-310	1er mai	A ensiler	A ensiler	A ensiler
		10-mai	A ensiler	A ensiler	A ensiler
1/2 tardives	>320	20-mai	A ensiler	A ensiler	16-sept
		1er mai	A ensiler	A ensiler	19-sept
		10-mai	A ensiler		
		20-mai	A ensiler		

Vers la fin des chantiers d'ensilage :

Les températures plus clémentes de ces derniers jours ont permis de ralentir la maturité. Les chantiers d'ensilages tirent à leur fin. Il est maintenant nécessaire de faire le point sur le bilan fourrager pour ajuster les stocks par rapport aux besoins. Suivant les secteurs les rendements sont très hétérogènes, les stratégies d'adaptations seront différentes suivant les objectifs de chacun : achat de fourrage, de sous-produit, augmentation de la part de concentré, ajustement du nombre d'animaux

Définissez votre stratégie d'assolement

Suite aux ensilages, la remise en culture des parcelles doit être réfléchi. Votre stratégie de rotation est guidée par vos besoins en fourrage et céréales maïs aussi par une orientation technique pour profiter de bénéfices agro-environnementaux. Elle se caractérise par l'introduction dans la rotation de légumineuses. En élevage, elles peuvent être introduites dans les prairies courtes ou longues durées (trèfle incarnat, trèfle violet, luzerne etc ...) mais aussi dans des méteils grains ou fourrage (vesce commune, pois fourrager, féverole etc...). Dans tous les cas la stratégie de rotation doit être écrite à l'avance et affiner suivant les problématiques de l'année. Pour les prairies, le choix des espèces doit être guidé par la pérennité, l'utilisation que l'on va en faire et le type de sol. Nous arrivons au 15 septembre et les dernières prairies longues durées doivent maintenant être installées. Pour les prairies plus rapides d'installation (ray grass, trèfle incarnat et éventuellement violet) les semis peuvent se prolonger un peu plus tard en saison. Pour les méteils, l'orientation grain ou fourrage doit être définie dès la mise en place. Si vous souhaitez le récolter en grains, la quantité de pois doit être au maximum de 20kg/ha, on peut monter à plus de 50kg si la récolte s'oriente en fourrage riche en protéine. N'hésitez pas à interroger votre conseiller pour de plus amples informations

Mickaël COQUARD

Port : 06 89 12 55 72

Mail : mickaelcoquard@cmre.fr

Note technique hebdomadaire - IPNS

SPEL - 18 Avenue des Monts d'Or

69890 LA TOUR DE SALVAGNY

