



Observer pour des fourrages de qualité

ELEVEUR DE FOURRAGE

Note Patur'RA

Note N°4 – semaine 14 – Mardi 03 mars 2018

La Chapelle de Mardore 650M

Cumul température 01/02 : 182°C
3.8 cm d'herbe dans les parcelles

Villechenève-670M

Cumul température 01/02 : 260°C
4.1 cm d'herbe dans les parcelles

Bibost- 400 M


Cumul température 01/02 : 310° c
6.7 cm d'herbe dans les parcelles
Croissance : 45kg/j/ha (38kg sur 15j)
5kg de MS pâturée

Pomeys 650 M

Cumul température 01/02 : 280°C
5.9 cm d'herbe dans les parcelles
Croissance : 45kg/j/ha (33kg sur 15j)
Mise à l'herbe depuis 16/03

longes -400 M

Cumul température 01/02 : 355°C
3.1 cm d'herbe dans les parcelles
Croissance : 28kg/j/ha




L'arrivée de température plus clémente va favoriser la pousse, la mise à l'herbe sera d'actualité cette semaine sur la majorité des secteurs.

L'année tardive risque d'être synonyme de pousse de l'herbe explosive. L'objectif est d'avoir fini le premier tour vers 450-500°C, soit suivant les secteurs entre le 15 et 25 avril.

La croissance a tout de même frêmi cette semaine et les températures annoncées pour les jours qui viennent devrait le confirmer. Sur les parcelles surexploitées à l'automne, elle peine à démarrer. La portance n'est pas encore à l'optimum mais devraient s'améliorer dans la semaine. Il faudra saisir cette opportunité pour lâcher les animaux et profiter de ces quelques jours de beau temps pour réaliser les transitions. Si les problèmes de portance sont encore forts, une stratégie limitant son impact doit être mise en œuvre :

- 1) Choisir les parcelles les plus saines et les plus filtrantes.
- 2) Lâcher quelques heures par jours pour limiter l'impact sur les parcelles. En quelques jours les animaux vont s'adapter et seront capable d'augmenter leur vitesse d'ingestion au pâturage pour optimiser leur temps de présence.
- 3) Préférer des parcelles d'une journée à des parcelles où l'impact se répètera sur 2 ou 3 j.
- 4) Si l'herbe est disponible en quantité suffisante, lâcher tôt le matin pour profiter du maximum de l'appétit des animaux.

Semis de prairie : avec ce début d'année tardif et humide, les semis de prairie ne sont en général pas encore réalisés. Sur le marché de nombreux mélanges prairiaux vous sont proposés, il convient de bien « disséquer » l'étiquette pour implanter des espèces correspondantes à vos besoins (pérennité, type d'exploitation, sol etc...). Les semis de prairie longues durée sur le printemps sont favorables aux légumineuses et particulièrement à la luzerne, mais sont finalement assez peu productif l'année du semis. Pour palier à ce manque de potentiel, l'implantation d'avoine de printemps juste avant le semis de prairie à raison de 50kg /ha peut permettre d'augmenter le potentiel de rendement sur la première année. L'implantation peut aussi se faire dans une céréale d'hiver peu développée où le potentiel de rendement n'est pas maximal. Pour les prairies à base de ray grass italien, une variété alternative aura plus de potentiel mais montra à l'épi dès le premier cycle. Si la prairie doit être exploitée en pâture, on plantera une variété non alternative pour profiter d'une pousse feuillue.



■ Espèce à privilégier avec une forte contribution à la production fourragère
■ Espèce d'accompagnement dont on attend un autre rôle que strictement productif
■ Espèce moins bien adaptée au sol et/ou à l'utilisation

Espèces	Sol sain et profond			Alternance hydrique			Hydromorphe			Séchant acide			Séchant calcaire		
	Fauche	Mixte	Pâturage	Fauche	Mixte	Pâturage	Fauche	Mixte	Pâturage	Fauche	Mixte	Pâturage	Fauche	Mixte	Pâturage
RGH *	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
RGA précoce à 1/2 tardif	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
RGA tardif à très tardif	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Dactyle	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Fétuque élevée	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Fétuque des prés	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Fléole	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Trèfle blanc	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Trèfle violet *	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Luzerne	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

Contact

Mickaël COQUARD
Port : 06 89 12 55 72
Mail : mickaëlcoquard@cmre.fr

Note technique hebdomadaire - IPNS
SPEL - 18 Avenue des Monts d'Or
69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Maison de l'élevage

