



Observer pour des fourrages de qualité ELEVEUR DE FOURRAGE

Note Patur'RA

Note N°5 – semaine 13 – Mardi 29 mars 2016

La Chapelle de Mardore 650M

Cumul température 01/02 : 186°C

4.9 cm dans les parcelles

Villechenève-670M

Cumul température 01/02 : 273°C

Croissance moyenne : 24 kg/j/ha

Bibost- 400 M

Cumul température 01/02 : 333° c

Croissance moyenne : 42 kg/ha/j (34 kg/ha sur 15j)

Mise à l'herbe la nuit prévue cette semaine

23,0 kg/vl à 43.2 tb et 34.2 tp

St catherine 800 M exploitation bio

Cumul température 01/02 : 213°

Hauteur moyenne 4.2 cm

Soucieu en jarrest -350 M

Cumul température 01/02 : 360°C

Croissance moyenne : 27 kg

L'arrivée de températures plus clémentes notamment les matins, sera plus favorable à la pousse. Elle est cependant hétérogène selon l'exposition, la nature et l'hygrométrie du sol.

Les écarts de température continuent à se creuser suivant l'exposition et entre les zones de plaine et d'altitude. Il est important de faire le tour des parcelles pour estimer la quantité d'herbe présente. La décision de mise à l'herbe ou de baisse de la complémentation à l'auge doit être guidée par cette hauteur d'herbe. Les températures annoncées cette semaine devraient être favorable à la pousse sur tous les secteurs. La croissance sera d'autant plus importante que la hauteur d'herbe est élevée. Une graminée fonctionne comme un capteur solaire. Plus elle a de surface foliaire plus elle est capable de produire de l'énergie et donc de la pousse. Au pâturage on ne cherche pas à faire exprimer le potentiel maximum de la plante, mais on recherche un compromis entre quantité et facilité de gestion. Quelques règles de base sur les hauteurs d'herbe sont à respecter pour optimiser ce compromis. En période de pleine pousse on visera donc 10-12 cm à l'entrée et 5-6 cm à la sortie des animaux

Plaines et coteaux (< à 500m) : Le repère de mise à l'herbe va être dépassé sur tous les secteurs. La croissance est en moyenne de plus de 35kg sur ces zones. Elle couvre environ 50% des besoins sur les exploitations disposant de plus de 25 ares/vl. Sur les secteurs les plus bas, cette semaine va marquer la fin du déprimage des parcelles de foin. Sur les secteurs intermédiaires, il restera encore quelques jours avant le stade épi 10 cm (450°). Profitez de ces parcelles pour agrandir la surface pâturée.

Monts du lyonnais et du beaujolais (> à 500m) : Les températures et le vent du nord freinent le développement de l'herbe. Malgré tout, il faut se tenir prêt pour la mise à l'herbe. Les 250°C, repère pour une mise à l'herbe précoce sur prairie fertile vont être atteints dans la semaine sur la plupart des secteurs. Il faudra profiter des bonnes conditions de portance.

Contact

Mickaël COQUARD

Port : 06 89 12 55 72

Mail : mickaelcoquard@cmre.fr

Note technique hebdomadaire - IPNS


SPEL - 18 Avenue des Monts d'Or

69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Maison de l'élevage
DU RHÔNE



évolution des cumuls température base 01/02 (0-18°C)



Croissance en fonction de la hauteur d'herbe

