



Observer pour mieux pâturer

Note Patur'RA

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°3 – semaine 13 – lundi 23 mars 2014

La Chapelle de Mardore 650M

Somme de t° : 335°
Croissance moyenne : 20kg/j/ha
24,5kg de lait/VL (+2kg en une semaine)

Villechenève-670M

Somme de t° : 380°
Croissance moyenne : 42kg/j/ha
Mise à l'herbe le 17/03/14

St pierre la palud- 400 M


Somme de t° : 410°
29 kg de lait/vl avec 30kg de maïs à l'auge
Fin du 1° tour
Ensilage prévu vers 15/04

St Martin en Haut 750 M

Somme de t° : 340°
Hauteur d'herbe dans les parcelles : 5,3cm

longes -500 M

Somme de t° : 420°



Après la pluie de ce week-end, la mise à l'herbe doit se poursuivre avec toutes les précautions d'usage..

Malgré l'annonce d'une semaine plus conforme aux températures de saison, 2014 a toujours de l'avance sur les années précédentes. Sur les zones les mieux exposées, les ray grass italiens non exploités cet automne ont eu une pousse hivernale conséquente. Si ce n'est déjà fait, surveillez la hauteur de l'épi dans la gaine. Les premiers épis pourraient sortir dès début avril sur certaines parcelles. Le chantier de récolte doit s'organiser au plus vite


Coteaux du lyonnais, plateau de Condrieu, plaine de Lyon et val de Saône : La somme de température a dépassé cette semaine les 370°C. La croissance journalière approchait la semaine dernière les 40 kg/j/ha. La ration distribuée à l'auge doit baisser petit à petit pour s'adapter à cette pousse. Avec des températures basses et un temps humide le risque de tétanie d'herbage est présent. Ne lâcher donc pas les animaux dès les premières heures de la journée et allonger la période de transition jusqu'au retour de température plus clémente.

Monts du lyonnais, monts du beaujolais : Les 300°C de cumuls sont atteints sur la majorité des secteurs. La pousse est de l'ordre de 20kg/j/ha. Les conditions pour une mise à l'herbe de quelques heures par jours sont toujours idéales.

Pâturage et temps de travail : C'est souvent le choix du système fourrager qui conditionne l'organisation du système d'exploitation. Du choix de ce système découlent, les types de stocks, de récoltes et certaines pointes de travail.

Jouer la carte de la pâture permet entre autre de réduire les quantités de stocks, les temps de distributions, les volumes de déjections. Les conséquences économiques seront positives. Plus d'herbe pâturée, n'est pas toujours synonyme de simplicité. Il faut pour cela préparer ces périodes pour que la gestion du pâturage soit facilitée.

Ci joint une étude réalisée à la ferme expérimentale de Trévarez



Evolution des sommes de température en base 0-18°

Jours de pâturage seul	70 j	150 j	180 j
Nuits à l'étable	195 nuits	135 nuits	85 nuits
Lisier (m ³)	425	335	230
Fumier (tonnes)	275	200	130
Heures de tracteur	430 h	290 h	200 h

Trévarez 2001

Utilisation des parcelles	Uniquement pâturées	Fauchées puis pâturées	Uniquement fauchées
Prairies	1 à 3 h/ha	5 à 8 h/ha	8 à 12 h/ha

Contact

Mickaël COQUARD

Port : 06 89 12 55 72

Mail : mickaelcoquard@cmre.fr

Note technique hebdomadaire - IPNS

SPEL - 18 Avenue des Monts d'Or

69890 LA TOUR DE SALVAGNY

