



Observer pour mieux pâturer

Note Patur'RA

Un réseau régional pour faciliter vos décisions


Note N°9 – semaine 20 – lundi 13 mai 2013

La Chapelle de Mardore 650M

Somme de t° : 600°
Croissance moyenne : 48 kg/ha/j
Moyenne sur les 15 derniers jours : 53kg/j/ha

Villechenève-670M

Somme de t° : 710°
Croissance moyenne : 55kg/ha/j
Moyenne sur les 15 derniers jours : 67kg/j/ha



St pierre la palud- 400 M

Somme de t° : 760°
Croissance moyenne : 100 kg/j/ha
Moyenne sur les 15 derniers jours : 105kg/j/ha

aveize -780 M

Somme de t° : 580°
Croissance moyenne : 130 kg/j/ha
Moyenne sur les 15 derniers jours : 108 kg/j/ha

longes -400 M

Somme de t° : 785°
Croissance moyenne : 72kg/ha/j
Moyenne sur les 15 derniers jours : 63 kg/j/ha

Les conditions climatiques sont toujours favorables à la pousse de l'herbe .Elle se traduit cette semaine par une croissance de 2,5cm d'herbe sur la semaine, soit près de 80kg/ha/j.

Avec l'avancée de la saison, le stade des plantes évolue et cette semaine la croissance est essentiellement due à la montée des tiges de graminées et l'arrivée des épis non consommés au tour précédent. Le rapport tiges/ feuilles se détériore au détriment de la qualité et de l'appétence. La valeur alimentaire de ces parcelles est donc en baisse, elle permet de couvrir 14-15 l de lait équilibré azote-énergie.

Si vous constatez cette évolution dans vos parcelles, il est important de corriger la complémentation dès aujourd'hui et ceci jusqu'à l'arrivée des parcelles d'ensilage dans la rotation. Profitez-en aussi pour faire une fauche de nettoyage et ainsi couper les épis et favoriser une repousse feuillue au prochain tour.


Les parcelles contenant beaucoup de légumineuses sont quand à elles plus souples et perdent moins de valeurs avec l'avancement de leur stade phénologique. La baisse de valeur alimentaire est donc moins importante sur ces prairies.

Les conditions de portance quand à elles ne s'améliorent pas, quelques précautions s'imposent pour ne pas trop dégrader les parcelles:


- sortir au parc des vaches ayant de l'appétit en les lâchant un peu plus tard qu'à l'accoutumée
- admettre une hauteur d'herbe à la sortie plus élevée qu'en temps normal (7-8cm)
- séparer les animaux en chaleur

Les ensilages sont en cours de réalisation et seront hétérogènes en qualité et en matière sèche. Pensez à réaliser une analyse pour juger de cette qualité et pour caler plus facilement votre ration

Evolution comparé de la digestibilité du trèfle blanc et de quelques graminées (source f95 andrieu)



croissance moyenne du Rhône



Contact

Mickaël COQUARD

Port : 06 89 12 55 72

Mail : mickaelcoquard@cmre.fr

Note technique hebdomadaire - IPNS

SPEL - 18 Avenue des Monts d'Or

69890 LA TOUR DE SALVAGNY

