




Météo de l'herbe

Bulletin des Savoie du 19 avril 2013


Le groupe Patur'RA Savoie vous propose un point sur la pousse de l'herbe dans votre journal Terres des Savoie, à retrouver chaque semaine sur le site internet www.fidocl.fr.

	Pousse moyenne quotidienne du 11/04 au 18/04		Somme de température (°C _{jour}) 19/04	Stade de l'herbe
	kgMS/ha/jour	Chargement théorique (ares/VL)		
Combe de Savoie (300m)	127	13	506	Epi à 5cm (Dactyle)
Albanais (400m)	122	13	402	
Poisy (500m)	125	13	402	
Bauges (800m)	51	31	248	Pousse végétative
Bornes (800m)	86	19	248	
Plateau de Gavot (900m)	/	/	181	
Moyenne	88	35		

Evolution de la somme de température à Chambéry (250m)



Croissance de l'herbe (kgMS/ha/jour)



OBSERVATIONS

Pousse de l'herbe : avec l'ensoleillement et les températures presque estivales, l'herbe a explosé cette semaine à basse altitude. Plus haut, ces conditions ont permis de lancer la pousse. Cette pousse devrait permettre des chargements de **4 voir 5 VL/ha à moins de 500m** et de **2 à 3VL/ha au dessus de 800m**.

Stades : suivant les prévisions météo, les zones à moins de 500m ont atteint 400 et 500 °C. Pour les zones situées à plus de 800m, nous sommes à 250°. Attention à partir de 500°C jour, **l'épi peut être consommé par les animaux au pâturage**. Cette consommation est positive dans le cadre de pâture car les repousses seront feuillues par contre elle est négative pour le rendement en foin dans les parcelles de fauches.

CONSEILS DE LA SEMAINE

A moins de 500m : avec les difficultés de mises à l'herbe dues à la portance des sols, il s'agit maintenant de gérer. Toujours en cours de transition alimentaire (minimum 15jours), il va falloir dès à présent prévoir des parcelles à débrayer. L'objectif est que les vaches aient toujours de l'herbe feuillue à pâturer : **moins de 15cm soit moins que hauteur mi-mollet**.

Il faudra aussi veiller à **arrêter de déprimer les parcelles de fauches** pour ne pas que les vaches coupent l'épi qui est en train de monter dans la tige. Ainsi le rendement en foin ne sera pas pénalisé.

A plus de 500m : **mettre à l'herbe dès que possible** même s'il y a encore peu d'herbe disponible pour permettre une transition lente. Prévoir **un premier passage sur 30 à 35 ares/VL au maximum** pour ne pas risquer de se faire déborder par les épis au cours du second passage.