






# Bulletin Herbe des Savoie

## Semaine du 16 au 23 mai 2013



**Pousse de l'herbe :** Elle reste globalement soutenue mais diminue ces derniers temps avec la fraîcheur. Le mauvais temps et les conditions de portance limitées ne permettent souvent pas d'appliquer une pression de pâturage suffisante pour maîtriser l'herbe, avec pour conséquence l'apparition de nombreux épis dans les parcs. Avec une pousse moyenne de **70kgMS/ha/jour**, la pousse permet toujours de nourrir **4 à 5 vaches/ha** de surface pâturée, soit un chargement optimal de 20 à 25 ares/VL.

**Stades :** On note toujours un retard d'une 10aine de jours par rapport à 2012. Le repère à **750°Cj** pour des fauches précoces à début épiaison est atteint jusque vers 500-600m d'altitude. Ce repère permet de produire des foins de bonne valeur alimentaire tout en permettant des rendements corrects. Le repère à 1000° (pleine épiaison-début floraison) pour des foins de valeur moyenne mais de bons rendements est atteint en plaine.



**Conseils de la semaine :**

Quelques pratiques permettent de limiter la dégradation des parcs de pâture en ces périodes humides :

- Lâcher des animaux qui ont faim, un peu plus tard que d'habitude pour augmenter la vitesse de consommation de l'herbe. Des travaux de recherche ont démontré que les animaux s'adaptent à des temps de pâturage plus courts, en mangeant plus vite, donc en piétinant moins.
- Rechercher des hauteurs d'herbe en sortie de parcelle à 7-8cm plutôt que 5cm.

Les parcelles où l'herbe est épiée ou trop haute (>15cm) seront, dans l'idéal, mieux valorisées par la fauche.

	UEL	MAT (%)	UFL	PDIN	PDIE	dMO
Herbe feuillue	1,02	20,9	0,9	111	141	74
Herbe épiée	1,05	11,1	0,79	74	83	66

**Mieux vaut un bon foin qu'un mauvais pâturage !**

La valeur de l'herbe chute fortement dès l'apparition des épis. Elle devient plus encombrante (valeur UEL en hausse), moins appétente, moins digestible (valeur dMO en baisse) et permet une production laitière bien inférieure à une herbe feuillue. Sans compter le gaspillage (herbe couchée, refusée) et la nécessité de broyer les parcs après le passage des animaux. Foiner une herbe haute ou épiée est toujours le meilleur compromis.

Gérard Juillet, Jean-Christophe Michaud - Elevage Avenir74 - 07 77 99 42 69  
 Guillaume Glénot - Chambre d'Agriculture Savoie Mont-Blanc - 06 13 91 01 25