

### Bassin annécien - Poisy - 450m

75 VL – 30 ares/VL – 22.7 l/VL – 5,2 mois moyen  
 Pâturage jour/nuit : 20/04  
**Croissance : 60 kgMS/ha/j**  
 Ration/VL: 1 à 2,6kg maïs/orge + 0,3kg foin  
**Soit 70 gr/litre de lait**

### Bornes - Éteaux – 850m


74VL – 34ares/VL  
 18,8l/VL – 6,5mois moyen  
 Pâturage jour/nuit : 10 mai  
**Croissance : 52 kgMS/ha/j**  
 Ration/VL : 1 kg Foin et 2kg VL18  
**Soit 106 gr/litre de lait**

### Albanais - Marigny - 370m

70VL – 37 ares/VL  
 19.1l/VL – 6,5 mois moyen  
**Croissance : 57 kg/MS/ha/j**  
 Ration : 4,2 kg concentrés  
**Soit 220 gr/litre de lait**

### Bauges - Puygros - 800m

44VL – 46 ares/VL  
 16l/VL – 6,5 mois moyen  
**Croissance : 74 kg/MS/ha/j**  
 Ration : 4 kg Foin et 0,7 kg concentrés  
**Soit 45 gr/litre de lait**



Voilà les 1000° atteints ou en vue pour les zones à moins de 700m. Cette somme de température correspond au stade plein épiaison des principales graminées de nos prairies (Dactyle, Fétuque, RGA). C'est aussi la floraison des légumineuses. A partir de maintenant la valeur alimentaire ne fera que baisser. Le rendement va continuer à augmenter jusqu'à la floraison (1200°). Pour le foin des vaches laitières c'est le moment d'agir si la météo le permet.

Les sommes de températures des stations les plus hautes sont comprises entre 400 et 550°. Malgré le froid des derniers jours et même la neige, les montées en alpage sont en cours. Avant de monter, il faut veiller à avoir un stock d'herbe sur pied suffisant permettant de sécuriser l'alimentation des animaux. Mais il ne faut pas attendre trop longtemps sinon les épis prendront vite le dessus.

Cette semaine au pâturage, la croissance a sensiblement ralenti avec le froid et la bise (61kgMS/ha/jour en moyenne). Si les surfaces sont limitées, ce ralentissement pose un problème de disponibilité d'herbe. Il faut alors limiter l'ingestion d'herbe en redonnant du fourrage à l'auge. Attention à ne pas tourner trop vite sur les parcelles. Un passage d'azote de 20 à 30gN peut permettre de soutenir la pousse. Dans un contexte non limitant, ce ralentissement va permettre de rattraper l'herbe.

En cas de refus, avec le durcissement lié à l'épiaison, vous pouvez faucher les refus par beau temps et les faire consommer par les vaches sur le champ.

Bonne Semaine

### Mis à jour au 21 mai 2015

Altitude	Station et altitude	Som t°C	Moy
200 - 400 m	CHAMBERY-AIX - 235	1047	1023
	MONTMELIAN - 264	1057	
	ALBERTVILLE JO - 335	1079	
	LAC AIGUEBELETTE - 375	978	
	THONON-INRA - 376	953	
400 - 700 m	BONNEVILLE - 450	930	973
	USINENS SA - 452	1014	
	MEYTHET - 458	950	
	STE MARIE CUINE - 460	1043	
	DOUVAIN SA - 470	984	
	GIEZ - 478	891	
	VERRENS-ARVEY ARBO - 530	1027	
700 - 1000 m	MASSINGY - 620	940	852
	ST MICHEL MAUR - 698	966	
	EVIAN SA - 725	771	
	SEYTHENET - 750	891	
	BOURG ST MAURICE - 865	920	
+ 1000 m	CHAPELLE SAINT-MAURICE - 970	711	538
	CHAMONIX - 1042	680	
	FREJUS - 1228	686	
	FECLAZ_SAPC - 1350	499	
	LE GRAND-BORNAND - 1430	482	
	MONT DU CHAT - 1496	470	
LE TOUR - 1500	556		
	COL-DES-SAISIES - 1633	391	

**CONTACT : Guillaume Glémot - 06 13 91 01 25**  
 Chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc

### Avec la participation de :

Jean Christophe Michaud – Coopérative des Eleveurs des Savoie  
 Romaric Puthod – Centre d'élevage de Poisy  
 Thomas Malvoisin – Chambre d'agriculture Savoie Mont Blanc