



### Bassin annécien - Poisy - 450m

81 VL – 28 ares/VL  
Croissance : 45kgMS/ha/j  
Hauteur moyenne : 6,4cm  
Mise à l'herbe prévue : une fois les parcelles ressuyées

### Bornes - Éteaux – 850m

77VL – 33ares/VL  
Croissance : 43kgMS/ha/j  
Hauteur moyenne : 4,2 cm  
Mise à l'herbe prévue : une fois les parcelles ressuyées

### Albanais - Marigny - 370m

62VL – 34 ares/VL  
Croissance : 51kg/MS/ha/j  
Hauteur moyenne : 5,4 cm  
Mise à l'herbe : 1<sup>er</sup> Avril

### Bauges - Puygros - 800m

43 VL – 44ares/VL  
Croissance : 30kgMS/ha/j  
Hauteur moyenne : 3,7cm  
Mise à l'herbe prévue : une fois les parcelles ressuyées

Cette semaine a été marquée par un « retour à la normal » de la pluviométrie avec en moyenne 60mm de précipitations reçue sur les deux départements entre dimanche et lundi. Il faut noter que les lames d'eau enregistrées sont très hétérogènes puisque localement les précipitations s'échelonnent de 20 mm (rive du Lac Léman, Bonneville) à plus de 100 mm (Albertville, Chambéry, Les Aravis, Le Beaufortain).

Le point positif est qu'il y a maintenant de l'eau disponible pour alimenter la croissance de l'herbe. Par contre, lorsque les précipitations ont été très importantes, la portance des prairies n'est plus au rendez-vous alors que nous sommes en pleine période de mise à l'herbe.

En effet, même si la semaine a été plutôt fraîche, les sommes de températures continuent de grimper. Le stade mise à l'herbe (300°), atteint la semaine dernière à moins de 400m, est maintenant dépassé pour la plupart des stations situées à moins de 700m. Si vous avez plus de 30ares/VL au pâturage, c'est le moment de mettre à l'herbe pour prendre le temps de faire une transition et surtout pour éviter d'être dépassé par l'herbe.

Pour ceux qui ont mis les vaches laitières au pâturage plus précocement, attention à ne pas « courir » après l'herbe : moins il y a d'herbe dans les parcs, plus le temps de passage est limité et le temps de repousses court. On entre alors dans un cercle vicieux aboutissant à un manque d'herbe. Il faut donc gérer vos temps de passage par parcelle grâce à la complémentation pour laisser le temps de repousser à la première parcelle du tour.

Le retour du beau temps en début de semaine, va favoriser la croissance de l'herbe en dessous de 1000m et faire verdier plus haut.

### Mis à jour au 1er Avril 2015

Altitude	Station et altitude	Som t°C	Moy
200 - 400 m	CHAMBERY-AIX - 235	362	339
	MONTMELIAN - 264	357	
	ALBERTVILLE JO - 335	352	
	LAC AIGUEBELETTE - 375	310	
	THONON-INRA - 376	315	
400 - 700 m	BONNEVILLE - 450	293	316
	USINENS SA - 452	342	
	MEYTHET - 458	303	
	STE MARIE CUINE - 460	344	
	DOUVAIN SA - 470	325	
	GIEZ - 478	273	
	VERRENS-ARVEY ARBO - 530	338	
700 - 1000 m	MASSINGY - 620	312	246
	ST MICHEL MAUR - 698	309	
	EVIAN SA - 725	212	
	SEYTHENET - 750	230	
	BOURG ST MAURICE - 865	294	
+ 1000 m	CHAPELLE SAINT-MAURICE - 970	186	116
	CHAMONIX - 1042	168	
	FREJUS - 1228	167	
	FECLAZ_SAPC - 1350	98	
	LE GRAND-BORNAND - 1430	85	
	MONT DU CHAT - 1496	90	
	LE TOUR - 1500	141	
COL-DES-SAISIES - 1633	66		

**CONTACT : Guillaume Glémot -06 13 91 01 25**  
Chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc