

Bassin annécien - Poisy - 450m

81 VL – 29 ares/VL – 22,5l/VL
Croissance : 45 kgMS/ha/j
Hauteur moyenne : 7,7 cm
Mise à l'herbe : 7 avril

Albanais - Marigny - 370m


62VL – 34 ares/VL – 22,5l/VL
Croissance : 21 kg/MS/ha/j
Hauteur moyenne : 4,8 cm
Mise à l'herbe : 1^{er} Avril

Bornes - Éteaux – 850m

77VL – 33ares/VL – 21,5l/VL
Croissance : 20 kgMS/ha/j
Hauteur moyenne : 4,7 cm
Mise à l'herbe : 9 avril

Bauges - Puygros - 800m

43 VL – 44ares/VL
Pas de mesures cette semaine



Cette semaine a été marqué par le retour du beau temps. Mais les gelées matinales et le vent ont été défavorables à la pousse de l'herbe. Alors que nous avons atteints en moyenne dans les 4 exploitations suivies 40kgMS/ha/j de croissance la semaine dernière, nous atteignons 20kgMS dans deux exploitations avec des hauteurs moyennes faibles. Lorsque la hauteur d'herbe est plus importante, comme à Poisy (7,7cm) la croissance se maintient. La hauteur d'herbe est un facteur de croissance important. **Il faut donc veiller à ne pas surpâturer (éviter les sorties de parcelles à moins de 5cm).**

N'oubliez pas que la fin du premier tour doit correspondre avec une hauteur de la première parcelle comprise entre 8-10cm.

La portance du sol est maintenant bonne, on voit les troupeaux sortir. A moins de 700m, si la pousse de l'herbe s'accélère, l'agrandissement du premier tour aux parcelles ne sera peut être pas nécessaire/possible. A plus de 700m, en fonction des hectares accessibles et de votre orientation la mise à l'herbe est souhaitable (repère 300° avec plus de 30are/VL).

Pour les premières sorties, visez 2 à 3h de temps avec une distribution de foin avant la sortie. Attention aux matinées fraîche avec de la rosée. Renforcez la complémentation en magnésium.

Pour augmenter ou diminuer la part d'herbe pâturée dans la ration, le meilleur moyen lors de la phase de transition consiste à jouer sur le temps de présence des VL dans la parcelle. Plus tard, la complémentation en foin et la limitation des surfaces offertes permettront de faire le tampon.

Attention à moins de 400m, les 500° se rapprochent, il faut arrêter de déprimer les prés de fauche sous peine de pénaliser le rendement de la première coupe.

Mis à jour au 9 Avril 2015

Altitude	Station et altitude	Som t°C	Moy
200 - 400 m	CHAMBERY-AIX - 235	435	407
	MONTMELIAN - 264	428	
	ALBERTVILLE JO - 335	426	
	LAC AIGUEBELETTE - 375	376	
	THONON-INRA - 376	369	
400 - 700 m	BONNEVILLE - 450	350	378
	USINENS SA - 452	407	
	MEYTHET - 458	363	
	STE MARIE CUINE - 460	412	
	DOUVAIN SA - 470	388	
	GIEZ - 478	327	
	VERRENS-ARVEY ARBO - 530	403	
700 - 1000 m	MASSINGY - 620	371	298
	ST MICHEL MAUR - 698	371	
	EVIAN SA - 725	256	
	SEYTHENET - 750	286	
	BOURG ST MAURICE - 865	353	
+ 1000 m	CHAPELLE SAINT-MAURICE - 970	223	140
	CHAMONIX - 1042	206	
	FREJUS - 1228	207	
	FECLAZ_SAPC - 1350	116	
	LE GRAND-BORNAND - 1430	103	
	MONT DU CHAT - 1496	106	
	LE TOUR - 1500	165	
COL-DES-SAISIES - 1633	80		

CONTACT : Guillaume Glémot - 06 13 91 01 25
Chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc

Avec la participation de :

Jean Christophe Michaud – Coopérative des Eleveurs des Savoie
Romaric Puthod – Centre d'élevage de Poisy
Thomas Malvoisin – Chambre d'agriculture Savoie Mont Blanc