

### Bassin annécien - Poisy - 450m

81 VL – 26 ares/VL – 22,5l/VL

**Croissance : 105 kgMS/ha/j**

Mise à l'herbe : 7 Avril

**Ration (en MS) : 4.5kg foin + 4kg Regain**

+ 2kg Epi + 0.9kg ttx soja + 2kg VL21

**Soit 222 gr/litre de lait (épi compris)**

### Albanais - Marigny - 370m

62VL – 34 ares/VL – 21,2l/VL

**Croissance : 78 kgMS/ha/j**

Mise à l'herbe : 1<sup>er</sup> Avril

**Ration : 8kg Foin et 4,8 kg concentrés**

**Soit 226 gr/litre de lait**

### Bornes - Éteaux – 850m

82VL – 31ares/VL – 22l/VL

**Croissance : 63 kgMS/ha/j**

Mise à l'herbe : 9 avril

**3kgMS consommés au pâturage**

+ Foin/Regain et 5 kg concentrés

**Soit 227 gr/litre de lait**

### Bauges - Puygros - 800m

46 VL – 45ares/VL – 15l/VL

**Croissance : 83 kgMS/ha/j**

Mise à l'herbe : 10 avril

**Ration : 8kg Foin et 1 kg concentrés**

**Soit 67 gr/litre de lait**

Quelle semaine estivale ! Le soleil et les températures ont fait démarrer les croissances sur les chapeaux de roues avec une moyenne sur les 4 exploitations suivies de 80kgMS/ha/jour. Pour repère, une telle pousse peut permettre de nourrir 5 VL/ha au pâturage seul (16kgMS d'herbe ingérés) soit un chargement de 20 ares/VL !

Après un démarrage plutôt calme des prairies (froid en début de semaine dernière + bise), les conditions étaient réunies cette semaine pour assister à une bonne croissance. Quelques précipitations sont prévues, souvent comprises entre 5 et 10mm. De quoi booster encore un peu la croissance mais pas forcément pour combler le déficit hydrique de certains secteurs.

Le tableau ci-dessous montre le nombre de degré jour cumulés en moyenne sur deux périodes par classe d'altitude. On note clairement l'accélération des cumuls cette semaine (+5°/jour entre les deux périodes).

	Du 1 <sup>er</sup> mars au 9 avril	Du 9 au 16 avril
200 – 400 m	9° / jour	14° / jour
400 – 700 m	9° / jour	14° / jour
700 – 1000 m	7° / jour	13° / jour
+ 1000 m	4° / jour	9° / jour

Avec ces cumuls, entre 200 et 700m, les 500° sont atteints ou en vue. Il faut donc arrêter le déprimage des prés de fauche. En effet l'épi des principales espèces de graminées (RGA, Dactyle, Fétuque) est à 5cm dans la gaine. S'il est coupé, les repousses seront feuillues. Pour les prairies pâturées, c'est le moment d'accentuer la pression pour que les animaux cisailent ces épis en cours de montaison.

Jusqu'à 1000m, les 300° sont atteints, c'est la mise à l'herbe !

### Mis à jour au 16 Avril 2015

Altitude	Station et altitude	Som t°C	Moy
200 - 400 m	CHAMBERY-AIX - 235	528	507
	MONTMELIAN - 264	527	
	ALBERTVILLE JO - 335	541	
	LAC AIGUEBELETTE - 375	475	
	THONON-INRA - 376	465	
400 - 700 m	BONNEVILLE - 450	442	477
	USINENS SA - 452	510	
	MEYTHET - 458	456	
	STE MARIE CUINE - 460	519	
	DOUVAIN SA - 470	488	
	GIEZ - 478	414	
	VERRENS-ARVEY ARBO - 530	512	
700 - 1000 m	MASSINGY - 620	474	392
	ST MICHEL MAUR - 698	471	
	EVIAN SA - 725	343	
	SEYTHENET - 750	393	
	BOURG ST MAURICE - 865	447	
+ 1000 m	CHAPELLE SAINT-MAURICE - 970	309	206
	CHAMONIX - 1042	274	
	FREJUS - 1228	287	
	FECLAZ_SAPC - 1350	178	
	LE GRAND-BORNAND - 1430	163	
	MONT DU CHAT - 1496	174	
	LE TOUR - 1500	231	
COL-DES-SAISIES - 1633	131		

**CONTACT : Guillaume Glémot - 06 13 91 01 25**  
Chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc

### Avec la participation de :

Jean Christophe Michaud – Coopérative des Eleveurs des Savoie

Romarc Puthod – Centre d'élevage de Poisy

Thomas Malvoisin – Chambre d'agriculture Savoie Mont Blanc