

### Bassin annécien - Poisy - 450m

75 VL – 30 ares/VL  
23,6 l/VL – 5,4 mois de lactation  
**Croissance : 93 kgMS/ha/j**  
Pâturage jour et nuit depuis le 20/04  
**Ration/VL : 2kgMS Epi + 0,3kg foin**  
**Soit 85 gr/litre de lait (épi=concentrés)**

### Albanais - Marigny - 370m

62VL – 37 ares/VL  
22,2l/VL – 6,5 mois de lactation  
**Croissance : 69 kg/MS/ha/j**  
Ration : 7kg Foin et 4,4 kg concentrés  
**Soit 198 gr/litre de lait**

### Bornes - Éteaux – 850m

74VL – 34ares/VL  
21,2l/VL – 6,5mois de lactation  
Pâturage jour et nuit prévu la semaine  
prochaine  
**Croissance : 77 kgMS/ha/j**  
**Ration/VL : 5kg Foin et 2kg VL18**

### Bauges - Puygros - 800m

Le retour de la pluie a fait du bien. Les précipitations sur la semaine vont de 30 à 80mm. Sauf sur la Maurienne et la Tarentaise avec des cumuls de 15 à 25mm. Cet épisode pluvieux ne semble pas être terminé. Les prévisions annoncent par endroit 70 à 80 mm supplémentaires pendant le weekend.

Les 700° sont atteints dans les secteurs bas et/ou précoces (Cluse de Chambéry, Combe de Savoie, Semine, Maurienne). Le stade est bon pour faire du foin précoce. Malheureusement avec le retour de la pluie et d'une météo plus aléatoire, il va falloir patienter. D'autant qu'on observe dans ces secteurs des épiaisons très précoces de dactyle et de Ray grass probablement dues aux fortes chaleurs de la semaine dernière et au stress hydrique.

Sur le pâturage, les croissances se sont maintenues en altitude malgré une gelée matinale. Elles ont explosé en bas avec le retour de la pluie. Résultats il faut absolument augmenter les ingestions d'herbe en passant en pâturage jour et nuit dès que possible et en diminuant voir en arrêtant la distribution de foin. Si ce n'est pas suffisant, le débrayage des parcelles est la dernière solution pour conserver les fameuses hauteurs d'entrée entre 10 et 12cm. Dans tous les cas, essayez d'obtenir des sorties de parcelles à 5cm ! Les repousses n'en seront que meilleures.

Avec les précipitations localement fortes, il faut limiter les dégâts dans les pâtures. Pour cela, il faut éviter le pâturage au fil. Si possible, variez les lieux d'entrée et de sortie des parcelles. Si les conditions deviennent vraiment humides voir boueuses, il faudrait alors limiter le temps de présence des animaux dans les parcelles sans pour autant diminuer les ingestions au pâturage.

**Bonne semaine**

Mis à jour au 29 Avril 2015			
Altitude	Station et altitude	Som t°C	Moy
200 - 400 m	CHAMBERY-AIX - 235	706	686
	MONTMELIAN - 264	715	
	ALBERTVILLE JO - 335	735	
	LAC AIGUEBELETTE - 375	652	
400 - 700 m	THONON-INRA - 376	623	651
	BONNEVILLE - 450	607	
	USINENS SA - 452	690	
	MEYTHET - 458	627	
	STE MARIE CUINE - 460	709	
	DOUVAIN SA - 470	659	
	GIEZ - 478	579	
700 - 1000 m	VERRENS-ARVEY ARBO - 530	697	534
	MASSINGY - 620	640	
	ST MICHEL MAUR - 698	647	
	EVIAN SA - 725	482	
	SEYTHENET - 750	485	
+ 1000 m	BOURG ST MAURICE - 865	613	312
	CHAPELLE SAINT-MAURICE - 970	443	
	CHAMONIX - 1042	411	
	FREJUS - 1228	421	
	FECLAZ_SAPC - 1350	281	
	LE GRAND-BORNAND - 1430	263	
MONT DU CHAT - 1496	267	312	
LE TOUR - 1500	338		
	COL-DES-SAISIES - 1633	206	

**CONTACT : Guillaume Glémot - 06 13 91 01 25**  
Chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc