


Bassin annécien
Poisy - 450m
Croissance : 90 kg MS/ha/jour
Mise à l'herbe le 28 mars
81 VL – 28 ares/VL

Albanais
Marigny St Marcel - 400m
Croissance : 60 kg MS/ha/jour
Mise à l'herbe le 20 mars
44 VL – 38 ares/VL

Avant Pays - Ayn - 550m
Croissance : 50 kg MS/ha/jour
Mise à l'herbe le 13 mars
33 VL – 40 ares/VL



Plateau Gavot
Vinzier - 900m
Croissance : 110 kg MS/ha/jour
Mise à l'herbe 7 avril
36VL – 35 ares/VL

Bornes - Groisy - 700m
Croissance : 57 kg MS/ha/jour
Mise à l'herbe 18 mars
33VL – 35 ares/VL

Massif des Bauges
Puygros - 800m
Croissance : 73 kg MS/ha/jour
Mise à l'herbe 7 avril
46VL – 40 ares/VL

Mis à jour au 23 mai

Altitude	Station et altitude	Som t°C	Moyenne
200 - 400 m	CHAMBERY-AIX - 235	1160	1145
	MONTMELIAN - 267	1194	
	ALBERTVILLE JO - 335	1224	
	LAC AIGUEBELETTE - 375	1094	
	THONON-INRA - 376	1054	
400 - 600 m	BONNEVILLE - 450	1011	1074
	USINENS SA - 452	1124	
	MEYTHET - 458	1059	
	STE MARIE CUINE - 460	1151	
	DOUVAIN SA - 470	1101	
	GIEZ - 478	997	
600 - 1000 m	ST MICHEL MAUR - 698	1064	927
	EVIAN SA - 725	862	
	BOURG ST MAURICE - 865	1000	
	CHAPELLE SAINT-MAURICE - 970	781	
+ 1000 m	CHAMONIX - 1042	725	570
	FREJUS - 1228	678	
	LE GRAND-BORNAND - 1430	447	
	MONT DU CHAT - 1496	459	
	LE TOUR - 1500	543	

Cette semaine :

A moins de 1000m,
Beaucoup de premières coupes ont été faites la semaine dernière grâce aux 6-7 jours de beau temps.
A moins de 600m, les stades de pousses de l'herbe étaient juste bons, il ne fallait pas rater la fenêtre météo.
Vu les stades, la qualité des foins semble au rendez-vous...en attendant les premières analyses.
A partir de maintenant, les prairies qui n'ont pas été coupées vont gagner encore un peu de rendement mais vont surtout perdre de la valeur alimentaire.

A plus de 1000m,
Les montées en montagnettes et alpage sont en cours. Avec les températures de la semaine dernière, la pousse de l'herbe s'accélère. N'oubliez pas qu'il vaut mieux attendre un peu l'herbe pour pâturer de la qualité plutôt que d'être dépassé !

La croissance de l'herbe se maintient à un bon niveau. Les parcelles fauchées rentrent maintenant dans la sole pâturée, ce qui va permettre d'augmenter le temps de retour sur les parcelles. De quoi accroître la part de pâturage dans les rations des exploitations limitées en surface.

Avec le retour de la pluie et des températures un peu moins élevées, la croissance des prairies devraient encore se maintenir voire augmenter dans les secteurs séchants. Pour les éleveurs trop justes en surface, n'hésitez pas à mettre un passage de 20 à 30 unités d'azote pour accélérer la pousse des parcelles fauchées et pouvoir agrandir votre tour de pâturage au plus vite.