



Bassin annécien
Poisy - 450m
Croissance : **kg MS/ha/jour**
Mise à l'herbe le 28 mars
81 VL – 28 ares/VL

Plateau Gavot
Vinzier - 900m
Croissance : **78 kg MS/ha/jour**
Mise à l'herbe 7 avril
36VL – 35 ares/VL

Albanais
Marigny St Marcel - 400m
Croissance : **84 kg MS/ha/jour**
Mise à l'herbe le 20 mars
44 VL – 38 ares/VL

Bornes - Groisy – 700m
Croissance : **64 kg MS/ha/jour**
Mise à l'herbe 18 mars
33VL – 35 ares/VL

Avant Pays - Ayn - 550m
Croissance : **115 kg MS/ha/jour**
Mise à l'herbe 13 mars
33 VL – 40 ares/VL

Massif des Bauges
Puygros - 800m
Croissance : **46 kg MS/ha/jour**
Mise à l'herbe 7 avril
46VL – 40 ares/VL

Mis à jour au 8 juin			
Altitude	Station et altitude	Som t°C	Moyenne
200 - 400 m	CHAMBERY-AIX - 235	1417	1396
	MONTMELIAN - 267	1428	
	ALBERTVILLE JO - 335	1491	
	LAC AIGUEBELETTE - 375	1341	
	THONON-INRA - 376	1302	
400 - 600 m	BONNEVILLE - 450	1249	1318
	USINENS SA - 452	1370	
	MEYTHET - 458	1303	
	STE MARIE CUINE - 460	1409	
	DOUVAINE SA - 470	1348	
	GIEZ - 478	1229	
600 - 1000 m	ST MICHEL MAUR - 698	1299	1150
	EVIAN SA - 725	1080	
	BOURG ST MAURICE - 865	1241	
	CHAPELLE SAINT-MAURICE - 970	981	
+ 1000 m	CHAMONIX - 1042	931	750
	FREJUS - 1228	884	
	LE GRAND-BORNAND - 1430	614	
	MONT DU CHAT - 1496	614	
	LE TOUR - 1500	709	

Cette semaine :

A moins de 1000m,
Les 1400° sont en vue à moins de 600m. Les stades de l'herbe sont maintenant très avancés pour les 1ères coupes. Les valeurs alimentaires ne seront pas très bonnes sauf pour les prairies mal exposées situées à plus de 800m, celles à flores tardives (fléole) ou celles ayant été déprimées sévèrement.

A plus de 1000m,
Les températures élevées des derniers jours font avancer les stades de l'herbe. En alpage, il va falloir gérer au mieux la montée des épis.

Les températures élevées sont enfin là ! Et la croissance s'en ressent. On atteint de nouveau les 80kg de pousse dans certains secteurs. Après plusieurs semaines à attendre l'herbe ces croissances vont redonner un peu de marge aux exploitations ayant moins de 35 ares par vaches.

Pour ceux qui ont plus de 35 ares par vaches, Il faut maximiser le pâturage : passez en pâturage jour/nuit, diminuez ou supprimez le foin des rations.

Après les 1ères coupes, attention au fertilisation azotée excessives (>40uN) qui ne favorisent pas les légumineuses.

Pour ceux qui ont fait les premières coupes avant le 1^{er} mai, il faut suivre l'évolution des parcelles de fauches. Souvenez-vous qu'une talle de graminées ne possède jamais plus de 4 feuilles. Une fois ces 4 feuilles créées, la plus ancienne meurent et laissent la place à une nouvelle. Il faut donc faire les secondes coupes avant la création de la 5^{ème} feuille pour éviter de gaspiller.