



Bassin annécien
Poisy - 450m
Croissance : 88 kg MS/ha/jour
81 VL – 26 ares/VL – 21,2l/VL
Pas de foin – 1,8kg concentrés

Plateau Gavot
Vinzier - 900m
Croissance : 98 kg MS/ha/jour
35VL – 36 ares/VL – 25l/VL
Pas de foin – 3,5kg concentrés

Albanais
Marigny St Marcel - 400m
Croissance : 80 kg MS/ha/jour
46 VL – 42 ares/VL – 22,5l/VL
Pas de foin – 4,7kg concentrés

Bornes - Groisy – 700m
Croissance : 88 kg MS/ha/jour
30VL – 33 ares/VL – 16,5l/VL
4kg foin – 4kg concentrés

Avant Pays - Ayn - 550m
Croissance : 58 kg MS/ha/jour
33 VL – 40 ares/VL – 27,5l/VL
5 kg foin – 5 kg concentrés

Massif des Bauges
Puygros - 800m
Croissance : 57 kg MS/ha/jour
42VL – 40 ares/VL – 14l/VL
Pas de foin – Pas de concentrés

Mis à jour au 14 juin

Altitude	Station et altitude	Som t°C	14-juin
200 - 400 m	CHAMBERY-AIX - 235	1525	1506
	MONTMELIAN - 267	1547	
	ALBERTVILLE JO - 335	1599	
	LAC AIGUEBELETTE - 375	1449	
	THONON-INRA - 376	1410	
400 - 600 m	BONNEVILLE - 450	1357	1426
	USINENS SA - 452	1478	
	MEYTHET - 458	1411	
	STE MARIE CUINE - 460	1517	
	DOUVAIN SA - 470	1456	
	GIEZ - 478	1337	
600 - 1000 m	ST MICHEL MAUR - 698	1418	1260
	EVIAN SA - 725	1187	
	BOURG ST MAURICE - 865	1349	
	CHAPELLE SAINT-MAURICE - 970	1088	
+ 1000 m	CHAMONIX - 1042	1036	854
	FREJUS - 1228	990	
	LE GRAND-BORNAND - 1430	717	
	MONT DU CHAT - 1496	715	
	LE TOUR - 1500	811	

Cette semaine :

Les observations à Groisy (Haute Savoie - 700m)
Les fléoles sont en train d'épiées. Les repousses de fétuques et dactyles sont en train de former la 4^{ème} feuille pour les parcelles fauchées début mai. Tout en finissant les premières coupes, il ne faudra pas tarder à lancer les regains. A moins de 600m, certains ont commencé les 2èmes coupes.
Faites le test chez vous, dans une parcelle déjà fauchées, regarder les talles des graminées majoritairement présentent. Lorsqu'en moyenne dans la prairie la 5^{ème} feuille est en train de sortir de la gaine : il faut faucher.

A plus de 1000m,
Les températures élevées des derniers jours font avancer les stades de l'herbe. En alpage, il va falloir gérer au mieux la montée des épis.

La pousse continue à se maintenir à des niveaux élevés grâce à la chaleur et à l'ensoleillement. Les orages ont été très localisés, empêchant les agriculteurs de continuer le foin mais n'apportant que très peu de précipitations globalement. La semaine qui commence devrait être similaire. Le sec devrait commencer à freiner la pousse de l'herbe dans les sols superficiels et les coteaux bien exposés. De plus les Ray Grass ne devraient pas tarder à se mettre « en grève » à cause de la chaleur. En effet, ils arrêtent de pousser quand la température dépasse 25°C.

Mais dans les parcelles de fauche riches en Ray Grass Italien, Hybride et Anglais précoce (variétés souvent très remontantes), ces espèces vont refaire un épi avant de se mettre en dormance. Il faut donc essayer de faire la deuxième coupe avant l'épiaison pour avoir des regains de qualité et pas une deuxième coupe équivalente à du foin !