



### Mis à jour au 21 juin

Altitude	Station et altitude	Som t°C	21-juin
200 - 400 m	CHAMBERY-AIX - 235	1651	1627
	MONTMELIAN - 267	1672	
	ALBERTVILLE JO - 335	1724	
	LAC AIGUEBELETTE - 375	1570	
	THONON-INRA - 376	1516	
400 - 600 m	BONNEVILLE - 450	1480	1549
	USINENS SA - 452	1604	
	MEYTHET - 458	1535	
	STE MARIE CUINE - 460	1639	
	DOUVAINE SA - 470	1580	
	GIEZ - 478	1457	
600 - 1000 m	ST MICHEL MAUR - 698	1536	1373
	EVIAN SA - 725	1297	
	BOURG ST MAURICE - 865	1467	
	CHAPELLE SAINT-MAURICE - 970	1192	
+ 1000 m	CHAMONIX - 1042	1136	943
	FREJUS - 1228	1086	
	LE GRAND-BORNAND - 1430	800	
	MONT DU CHAT - 1496	795	
	LE TOUR - 1500	896	

### Organisation des semis et sursemis

La réussite des semis et des sursemis est grandement due à une bonne préparation en amont du semis. A l'automne les semis peuvent commencer à partir du 15 aout et doivent se terminer au 15 septembre. Il faut donc être prêt à intervenir dès que la fenêtre météo se présentera.

Il faut donc dès maintenant :

- sélectionner les surfaces à semer ou sursemer,
- prévoir l'itinéraire technique (surtout en sursemis),
- choisir (et acheter) les espèces et les variétés adaptées à la parcelle et à son exploitation.

Pour le choix des espèces et des variétés, vous pouvez vous référer au site internet du GNIS ([www.herbe-book.org](http://www.herbe-book.org)).

N'hésitez pas à faire appel à nous pour tout conseil sur les implantations de prairie.

### Dernier bulletin herbe de l'année !

La croissance a ralenti cette semaine. La sensation de sec augmente et les prairies tout juste pâturées ou fauchées ont plus de mal à repartir. Même si des orages sont annoncés, les précipitations ne devraient pas être généralisées.

Nous entrons dans la phase estivale de la pousse de l'herbe. Il faut donc agrandir le tour de pâturage ou commencer l'affouragement en vert ou encore augmenter la part de foin dans les rations. La complémentation en concentrés est aussi à revoir pour correspondre aux nouvelles rations.

Les secondes coupes sont en cours à moins de 600m. Au dessus de 1000m, il faut avancer dans les foins. En fonction de l'orientation, les sommes de températures augmentent rapidement. Au Grand Bornand (1430m, exposé Nord), on arrive à 800° soit le bon stade pour la fauche précoce.