


**N°4 – 4 au 11 avril 2014**

**Bassin annécien**
**Poisy - 450m**
**Croissance : 82 kg MS/ha/jour**

Mise à l'herbe le 28 mars

81 VL – 28 ares/VL

**Plateau Gavot**
**Vinzier - 900m**
**Croissance : 80 kg MS/ha/jour**

Mise à l'herbe 7 avril

36VL – 35 ares/VL

**Albanais**
**Marigny St Marcel - 400m**
**Croissance : 82 kg MS/ha/jour**

Mise à l'herbe le 20 mars

44 VL – 38 ares/VL

**Bornes - Groisy – 700m**
**Croissance : 85 kg MS/ha/jour**

Mise à l'herbe 18 mars

33VL – 35 ares/VL

**Avant Pays - Ayn - 550m**
**Croissance : 97 kg MS/ha/jour**

Mise à l'herbe 13 mars

28 VL – 40 ares/VL

**Massif des Bauges**
**Puygros - 800m**
**Croissance : 94 kg MS/ha/jour**

Mise à l'herbe 7 avril

46VL – 40 ares/VL

**Mis à jour au 11 avril**

Altitude	Station et altitude	Som t°C	Moyenne
200 - 400 m	CHAMBERY-AIX - 235	598	593
	MONTMELIAN - 267	626	
	ALBERTVILLE JO - 335	645	
	LAC AIGUEBELETTE - 375	561	
	THONON-INRA - 376	536	
400 - 600 m	BONNEVILLE - 450	508	554
	USINENS SA - 452	590	
	MEYTHET - 458	539	
	STE MARIE CUINE - 460	602	
	DOUVAIN SA - 470	574	
	GIEZ - 478	510	
600 - 1000 m	ST MICHEL MAUR - 698	556	468
	EVIAN SA - 725	425	
	BOURG ST MAURICE - 865	501	
	CHAPELLE SAINT-MAURICE - 970	390	
+ 1000 m	CHAMONIX - 1042	322	249
	FREJUS - 1228	294	
	LE GRAND-BORNAND - 1430	169	
	MONT DU CHAT - 1496	206	
	LE TOUR - 1500	253	

**Chargement et pâturage**

Une vache laitière consomme entre 16 et 18kgMS/jour en plein pâturage (sans foin et sans concentrés).

L'apport de concentrés et/ou de foin diminue la consommation d'herbe par substitution :

- 1kg de concentrés → 0,4kgMS d'herbe en moins
- 1kg de foin → 1,1kgMS d'herbe en moins

Soit pour un apport de 3kg de foin et 3kg de concentrés par VL et par jour, c'est 4,5kgMS d'herbe pâturée en moins par les VL.

**Pousse de 60kgMS/ha/jour**

- 100% Pâturage : 3,5VL/ha → 29ares/VL
- 3kg foin et concentrés : 4,8VL/ha → 20ares/VL

**Pousse de 80kgMS/ha/jour**

- 100% Pâturage : 4,7VL/ha → 21ares/VL
- 3kg foin et concentrés : 6,4VL/ha → 15ares/VL

Alors que la croissance de l'herbe s'accélère, tenez compte de votre chargement pour ne pas vous faire dépasser. Pour augmenter la consommation d'herbe, diminuez, voire arrêtez la distribution de foin.

Le cumul des températures s'accélère. Nous avons cumulé entre 90 et 100° en une semaine jusqu'à 1000m d'altitude. A plus de 1000m 60° ont été cumulé cette semaine. La pousse de l'herbe étant directement corrélée à ce cumul, nous obtenons des croissances dignes du mois de mai : en moyenne 85kgMS/ha/jour.

Maintenant que la croissance est bien lancée, il ne faut pas se faire dépasser. Ce qui veut dire rentrer dans une nouvelle parcelle avec une hauteur de moins de 15cm soit de l'herbe à hauteur de la cheville. Pour cela il faut soit augmenter la consommation d'herbe par les VL pour tourner plus vite sur les parcelles (voir encadré ci-dessus) soit décider de faucher certaines parcelles qui reviendront ensuite dans la sole pâturée.

Au niveau des sommes de températures, nous sommes sur les bases de l'année 2011 soit 2 à 3 semaines d'avance par rapport à 2013. Il faudra donc se préparer à faire les premières coupes à partir de début mai.... dans 15 jours !