

**Bassin annécien**  
**Poisy - 450m**  
Croissance : 61 kg MS/ha/jour  
Mise à l'herbe le 28 mars  
81 VL – 28 ares/VL


**Plateau Gavot**  
**Vinzier - 900m**  
Croissance : 74 kg MS/ha/jour  
Mise à l'herbe 7 avril  
36VL – 35 ares/VL

**Albanais**  
**Marigny St Marcel - 400m**  
Croissance : 63 kg MS/ha/jour  
Mise à l'herbe le 20 mars  
44 VL – 38 ares/VL

**Bornes - Groisy – 700m**  
Croissance : 71 kg MS/ha/jour  
Mise à l'herbe 18 mars  
33VL – 35 ares/VL

**Avant Pays - Ayn - 550m**  
Croissance : 47 kg MS/ha/jour  
Mise à l'herbe 13 mars  
28 VL – 40 ares/VL

**Massif des Bauges**  
**Puygros - 800m**  
Croissance : 80 kg MS/ha/jour  
Mise à l'herbe 7 avril  
46VL – 40 ares/VL



Mis à jour au 17 avril

Altitude	Station et altitude	Som t°C	Moyenne
200 - 400 m	CHAMBERY-AIX - 235	694	685
	MONTMELIAN - 267	725	
	ALBERTVILLE JO - 335	749	
	LAC AIGUEBELETTE - 375	655	
	THONON-INRA - 376	604	
400 - 600 m	BONNEVILLE - 450	573	625
	USINENS SA - 452	664	
	MEYTHET - 458	609	
	STE MARIE CUINE - 460	686	
	DOUVAIN SA - 470	643	
	GIEZ - 478	573	
600 - 1000 m	ST MICHEL MAUR - 698	650	542
	EVIAN SA - 725	480	
	BOURG ST MAURICE - 865	594	
	CHAPELLE SAINT-MAURICE - 970	444	
+ 1000 m	CHAMONIX - 1042	374	300
	FREJUS - 1228	368	
	LE GRAND-BORNAND - 1430	205	
	MONT DU CHAT - 1496	260	
	LE TOUR - 1500	295	

### Rappel des stades

- 200 ° → Premier apport d'azote
- 300° → Mise à l'herbe
- 400° → Fin sursemis printemps
- 500 ° → Fin Déprimage / Début Étêtage
- 700 – 800° → Fauche précoce**
- 1000 ° → Fauche tardive

**Moins de 600m :** les 700° se rapprochent ou sont atteints. Il faut être prêt à saisir l'opportunité de faucher dès la prochaine période de beaux temps.

**600-1000m :** Surveiller la montée des épis dans les gaines pour arrêter le déprimage des prés de fauche

**+1000m :** la mise à l'herbe approche (en fonction de l'orientation)

Malgré le soleil encore bien présent cette semaine, les gelées ont refait leur apparition jusqu'à 400m. La bise bien présente elle aussi a accentué la sensation de froid. Le cumul des températures a donc bien ralenti. Le manque d'eau commence à se faire sentir par endroit. Tous ces éléments font que la croissance diminue cette semaine tout en restant à des valeurs tout à fait correctes pour la mi-avril (60kgMS de moyenne).

Cette semaine nous avons pu voir les premières faucheuses de sortie. Ces premières coupes très précoces amène de la sécurité « ce qui est fait est fait ! » et peuvent aussi permettre d'ouvrir de nouvelles surfaces au pâturage si ce sont des parcelles accessibles. Ces pratiques précoces correspondent exactement au scénario de 2011.

Dans les pâtures, il faut être vigilant à la montée en épi et donc au zone de refus. N'hésitez pas à faucher 2 jours avant la sortie de la parcelle et laisser les animaux consommer les refus au sol.