

Bulletin Herbe des Savoie

PEP POLINIS LAIT



N°3 - 18 au 25 mars 2016

Bassin annécien - Poisy - 450m

78 VL – 50 ares/VL - 26,5 I/VL – 5,9 MM

Mise à l'herbe 21 mars

Croissance: 12 kgMS/ha/j

Ration/VL: Foin/Regain, épi, + 4,2kg conc.

Soit 158 gr/litre de lait

Albanais - Marigny - 370m

66 VL - 41 ares/VL - 21 I/VL

Mise à l'herbe 21 mars

Croissance: 19 kgMS/ha/j

Ration/VL: Foin/Regain, épi, + 4kg conc.

Soit 190 gr/litre de lait

Données mises à jour au 24 mars 2016			
Altitude	Station et altitude	Som t°C	Moy
		1er février	1er fev
200 - 400 m	CHAMBERY-AIX - 235	339	317
	MONTMELIAN - 264	337	
	ALBERTVILLE JO - 335	344	
	LAC AIGUEBELETTE - 375	283	
	THONON-INRA - 376	282	
400 - 700 m	BONNEVILLE - 450	255	
	USINENS SA - 452	286	
	MEYTHET - 458	265	280
	STE MARIE CUINE - 460	320	
	DOUVAINE SA - 470	281	
	GIEZ - 478	253	
	VERRENS ARVEY - 530	304	
700 - 1000 m	ST MICHEL MAUR - 698	274	207
	EVIAN SA - 725	177	
	BOURG ST MAURICE - 865	237	
	CHAP. ST MAURICE - 970	141	
+ 1000 m	CHAMONIX - 1042	119	
	FREJUS - 1228	111	74
	FECLAZ_SAPC - 1350	62	
	GRAND BORNAND - 1430	52	
	MONT DU CHAT - 1496	52	
	LE TOUR - 1500	77	
	COL-DES-SAISIES - 1633	43	

CONTACT : Guillaume Glémot - 06 13 91 01 25 Chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc







Bornes - Éteaux - 850m

80 VL – 31 ares/VL – 21,8 l/VL Hauteur d'herbe moyenne = 4,5cm Mise à l'herbe prévue 10 avril Ration/VL: Foin/Regain, 4,5kg conc. Soit 183 gr/litre de lait

Bauges - Puygros - 800m

Première mesure la semaine prochaine

Touffes de dactyle, pousse hivernale et refus de 2015

Photo prise jeudi 24 mars à Marigny Saint Marcel lors des mesures de hauteurs d'herbe



Toujours frais le matin et forte bise... la pousse de l'herbe a du mal à décoller (à peine 20kgMS/ha/jour à Poisy et Marigny) mais cela permet de prendre de l'avance et de maitriser le premier tour pour ceux qui ont mis à l'herbe.

Dans ces deux exploitations, la mise à l'herbe a eu lieu le 21 mars ce qui correspond à environ 250° jour de cumul depuis le 1^{er} février. C'est une mise à l'herbe plutôt précoce (avant 300°) permise par des surfaces importantes accessible au pâturage (50 et 41 ares/VL).

La photo ci-dessus montre l'herbe résiduelle qu'il faut absolument faire consommer pour que les repousses soit de qualité. Si ce n'est pas fait, toutes ces touffes constitueront des refus.

Quelques précautions à prendre pour la mise à l'herbe :

- sortir en fin de matinée ou début d'après midi,
- -des vaches ayant consommées une partie de leur ration,
- la première sortie peut être courte (2 à 3h),

Si la mise à l'herbe se confirme, pensez à modifier la ration : moins de foin/regain, moins d'azote en fonction de la part d'herbe pâturée et modification de la complémentation minérale.

Attention à l'arrivée de quelques précipitations qui pourraient booster la pousse de l'herbe. A moins de 700m, il faut mettre à l'herbe pour ne pas se retrouver dépasser dans quelques semaines...

Avec la participation de :

Jean Christophe Michaud – Coopérative des Eleveurs des Savoie Romaric Puthod – Centre d'élevage de Poisy

Thomas Malvoisin – Chambre d'agriculture Savoie Mont Blanc