

Bassin annécien - Poisy - 530m

76 VL – 36 ares/VL – 25,2 l/VL – 6 MM
Chargement après débrayage = 34 ares/VL
Croissance : 53 kgMS/ha/j
Croissance mois Avril : 73kgMS
Ration/VL: 0 Fourrages + 2kg conc.
Cout de la ration : 41€/ML

Albanais - Marigny - 370m


69 VL – 41 ares/VL – 22,3 l/VL
Chargement après débrayage = 33 ares/VL
Croissance : 61 kgMS/ha/j
Croissance mois Avril : 68kgMS
Ration/VL: 4kg Foin + 2,8kg conc.
Cout de la ration : 65€/ML

Bornes - Éteaux – 850m

80 VL – 32 ares/VL – 19 l/VL
Chargement après débrayage = 26 ares/VL
Croissance : 31 kgMS/ha/j
Croissance mois Avril : 69kgMS
Ration/VL: 6kg Foin + 3 kg conc.
Cout de la ration : 116€/ML

Bauges - Puygros - 800m

42 VL – 55 ares/VL – 15 l/VL
Chargement après débrayage = 47 ares/VL
Croissance : 71 kgMS/ha/j
Croissance mois Avril : 84kgMS
Ration/VL: 0kg Fourrages +2,25 kg conc.
Cout de la ration : 99€/ML



Données mises à jour au 28 avril 2016

Altitude	Station et altitude	Som t°C 1er février	Moy.
200 - 400 m	CHAMBERY-AIX - 235	729	705
	MONTMELIAN - 264	739	
	ALBERTVILLE JO - 335	767	
	LAC AIGUEBELETTE - 375	644	
	THONON-INRA - 376	646	
400 - 700 m	BONNEVILLE - 450	607	647
	USINENS SA - 452	649	
	MEYTHET - 458	613	
	STE MARIE CUINE - 460	723	
	DOUVAIN SA - 470	650	
	GIEZ - 478	599	
700 - 1000 m	VERRENS ARVEY - 530	687	529
	ST MICHEL MAUR - 698	654	
	EVIAN SA - 725	469	
	BOURG ST MAURICE - 865	593	
+ 1000 m	CHAP. ST MAURICE - 970	399	255
	CHAMONIX - 1042	381	
	FREJUS - 1228	363	
	FECLAZ_SAPC - 1350	233	
	GRAND BORNAND - 1430	195	
	MONT DU CHAT - 1496	201	
	LE TOUR - 1500	244	
COL-DES-SAISIES - 1633	164		

CONTACT : Guillaume Glémot - 06 13 91 01 25
Chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc

Rencontre technique sur le pâturage

10h-12h30

4 mai : Daniel Nicoud – Vinzier

Gelées matinales, neige et vent ont calmé la pousse de l'herbe et le cumul des températures. Pour ceux qui étaient dépassé par la forte pousse depuis début avril ont pu rattraper un peu de leur retard, ce qui est plutôt positif. Pour ceux qui sont limités en surface il faut compléter en attendant que la pousse revienne.

Au vue des prévisions, la pousse devrait redémarrer cette semaine avec de fortes croissances attendues pour la fin de la semaine prochaine. N'oubliez pas de réduire le foin voir de l'arrêter pour maximiser l'herbe pâturée.

A moins de 700m, les 700° jours sont en vue. Avec l'hiver plutôt doux, les stades de l'herbe semblent en avance. Les coupes précoces sont possibles. Pour le pâturage, c'est l'occasion de couper les parcelles débrayées pour avoir des surfaces disponibles rapidement en cas de croissances faibles sur le mois de mai.

Point technique : l'acidose au pâturage...

Transit très rapide, TB en chute, perte d'état... tous ces signes laisseraient penser que l'herbe est acidogène. **FAUX**
La seule condition acidogène au pâturage, c'est l'excès de concentrés. L'herbe seule ne pose pas de problème. Elle entraîne naturellement un transit rapide non préjudiciable pour la vache. De même, sa composition et sa digestion sont défavorables à la synthèse de la matière grasse. Il est donc normal que le TB baisse. De plus à la pâture, chaque kg de concentrés fait baisser de 0.2g/kg le TB.

- Favoriser les amidons lents comme le maïs
- Limiter les concentrés à 4-5kg/VL maximum

Dans ces conditions si vous avez assez d'herbe, pas besoin de foin.

Avec les contributions de :

Jean Christophe Michaud – Coopérative des Eleveurs des Savoie
Romaric Puthod – Centre d'élevage de Poisy
Thomas Malvoisin – Chambre d'agriculture Savoie Mont Blanc