



# Météo de l'herbe

Bulletin des Savoie du 6 juin 2012



|                        | Pousse moyenne quotidienne du 25/05 au 01/06 |                                | Le point sur les stades au 01/06 (prairies productives et précoces) |                       |
|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                        | kgMS/ha/jour                                 | Chargement théorique (ares/VL) | Somme de température (°C <sub>jour</sub> )                          | Stade indicatif       |
| Combe de Savoie (300m) | 84                                           | 19                             | 1210                                                                | <b>Fructification</b> |
| Avant pays (300m)      | 93                                           | 17                             |                                                                     |                       |
| Albanais (400m)        | 53                                           | 30                             | 1140                                                                | <b>Floraison</b>      |
| Poisy (500m)           | 119                                          | 13                             |                                                                     |                       |
| Chablais (600m)        | 100                                          | 16                             | 1010                                                                | <b>Epiaison</b>       |
| Bornes (800m)          | 32                                           | 50                             |                                                                     |                       |
| <b>Moyenne</b>         | <b>80 (+11)</b>                              | <b>24</b>                      |                                                                     |                       |

Pousse de l'herbe : en moyenne, **elle se maintient** par rapport à la semaine précédente, favorisée par la chaleur et l'eau disponible dans les sols. Cependant, elle est très hétérogène selon la conduite du pâturage dans chaque exploitation. Avec **un chargement théorique de 24 ares/VL**, elle permet encore de nourrir 4 vaches à l'hectare.

Stades : ils évoluent très vite avec la chaleur. **Le stade floraison (1000°Cj)** va être atteint jusque vers 800m d'altitude, **le stade fructification** est atteint en plaine. **La pleine floraison/début fructification (1200°Cj)** est le repère à retenir pour les foins tardifs, à ne pas dépasser autant que possible.

## Conseils de la semaine :

- **Faucher** dès que les conditions le permettent à toutes altitudes.
- **Anticiper un ralentissement de la pousse** de l'herbe en intégrant des repousses de fauches à la sole pâturée pour atteindre **30-35 ares/VL**.
- **Augmenter les temps de retour** sur les parcelles pâturées pour atteindre 4 à 5 semaines afin de créer des stocks sur pieds suffisants.



## Le stade fructification

annonce la fin de la phase reproductrice des graminées. Les tiges et épis meurent progressivement et la prairie jaunit. Les plantes remobilisent une partie des constituants de ces organes reproducteurs pour ne laisser que les parois (lignine, cellulose) peu digestibles et peu nutritives.