



# Météo de l'herbe

Bulletin des Savoie du 09 mai 2012

	Pousse moyenne quotidienne du 27/04 au 04/05		Le point sur les stades au 05/05 (prairies productives et précoces)	
	kgMS/ha/jour	Chargement théorique (ares/VL)	Somme de température (°C <sub>jour</sub> )	Stade indicatif
Combe de Savoie (300m)	140	11	770	<b>Epiaison</b>
Avant pays (300m)	100	16		
Albanais (400m)	112	14	710	<b>Montaison</b>
Poisy (500m)	91	18		
Chablais (600m)	87	18		
Bornes (800m)	121	13		
<b>Moyenne</b>	<b>109 (+26)</b>	<b>15</b>		

**Pousse de l'herbe :** Elle explose cette semaine avec l'arrivée de l'épiaison (stade où l'accumulation de biomasse est maximale). Elle est accentuée par le sous pâturage observé de manière générale en avril et les conditions météo plus chaudes. Avec un chargement théorique de 15 ares/VL, elle permet de nourrir 6 à 7 VL à l'hectare.

**Stades :** le stade épiaison (repère 750°Cj) est pleinement atteint ou est imminent jusque vers 400-500m. Plus haut, les épis sont en cours de montaison et apparaissent progressivement.

### Conseils de la semaine :

- Appliquer une pression de pâturage élevée (limiter la surface offerte à 20/25 ares/VL au maximum) et préférer la fauche dans les parcs de pâture épiés ou si l'herbe est très haute (>20cm à l'herbomètre). L'herbe épiée sera mieux valorisée par la fauche dans tous les cas.
- Opter pour des fauches précoces dès que les conditions deviendront favorables pour offrir rapidement les repousses en pâturage.

