



A retenir cette semaine :

La pousse de l'herbe se maintient en croissance à 36 Kg MS/ha/jour de moyenne sur le département la semaine dernière, soit 10 kg de moins que la moyenne 2011-2022.



Sommes de température :

Récolte début épiaison : Ensilage, enrubannage ou foin ventilé : 850 à 900 °C

Pleine épiaison : 1 000 °C foin précoce

Pleine floraison : 1 200 °C période de foin optimale

Floraison terminée : 1 400 °C foin mûr



Réseau suivi croissance d'herbe :

Localisation	Hauteur (cm)	Kg MS/ha/Jour	Mise à l'herbe
St Marcel de Félines, 490m	7,8	26	Fin du troisième tour
Violay, 700m	8,5	55	Pâturage derrière ensilage
Violay, 710m	8,4	48	Fin 4 ^{ème} tour, rajout parcelles ensilées
Violay, 850m	8,4	46	Pâturage PT derrière ensilage
St Héand, 700m	11,5	33	Pâturage jour et nuit
Chirassimont, 600 m	6,9	27	Pâturage jour et nuit + 1/3 ration
Lay, 450 m	7,2	35	Pâturage jour et nuit + ½ ration
St Bonnet le Courreau, 900m	8,6	21	Pâturage jour + 1/4 ration
St Christo en Jarez, 800m	7,5	53	Pâturage jour et nuit + foin



Du côté de la technique : Privilégiez la qualité

Choix des récoltes : foin de première coupe et ensilage en deuxième coupe

Lorsque les fenêtres météo sont limitées et que les travaux s'accumulent, privilégiez la récolte des fourrages destinés aux animaux plus productifs (vaches laitières, animaux à l'engrais) ayant plus de besoins. Pour cela, il vaut mieux récolter ses deuxièmes coupes avant de finir la récolte des foins qui seront plutôt destinés aux génisses !



Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Juin
Bard	1120	27,6
Noirétable	1149	33,1
St Sauveur en Rue	1159	36,3
Violay	1159	22,4

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Juin
Chazelles sur Lyon	1248	27
Fourneaux	1303	32,6
La Valla en Gier	1287	37,2
Panissières	1274	20,1
St Georges en Couzan	1214	60,3

Stations météo	Somme T°C depuis 01/02	Cumul pluvio. Juin
Arthun	1287	10,8
Balbigny	1353	12,8
Nandax	1344	12
Pélussin	1441	19
Savigneux	1304	33,4
Veauchette	1328	24,8



Montagne (> 800m)

Encore 110 °C de cumulés la semaine dernière, la végétation évolue ; les foins vont pouvoir se réaliser, avec une fenêtre météo favorable en fin de semaine



Coteaux (600-800m)

Les premières coupes de foin traditionnel vont se poursuivre ainsi que la récolte des repousses d'ensilage réalisés début mai



Plaine (400-600mm)

Sur des prairies à base de ray-grass et dactyle, les repousses sont à exploiter en pâturage à partir de 15-18 jours après la dernière récolte, afin de valoriser l'herbe jeune et limiter la remontée à épisaison

Source infoclimat / météo France au 10/06/2023



*Génisses de 4 à 6 mois
pâturant la journée un
parcelle avec peu d'herbe
et rentrées en stabulation
la nuit*



Retrouvez nous sur le site <http://www.fidocl.fr>
Contact : Stéphane LAURENT
 slaurent@loire-conseil-elevage.fr
 Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalais Le Comtal



Retrouvez nous sur le site <https://extranet-loire.chambres-agriculture.fr/>
Contact : Fanélie BOYER
 fanelie.boyer@loire.chambagri.fr
 Chambre d'Agriculture – 42272 St Priest En Jarez